

a aethetose, ou o facto acima citado, não é mais do que um specimen, de feições mais raras, da hystero-epilepsia.

British Medical Journal, december 15, 1877. — *Gazette Medicale de Paris*, 6 Fevr. 1878.

RESENHA THERAPEUTICA

A therebentina na febre typhoide.—O Dr. White de Dublin affirma (*British Medical Journal*, Dezembro 15) não ter perdido nenhum caso de febre typhoide em que tivesse empregado a therebentina. Sua formula ainda nos casos complicados de bronchite e diarrrhéa, é a seguinte:

R. Oleo essencial de therebentina.....	} ana 7, 5 grammas
Solução de potassa.....	
Mucilagem de acacia.....	15 grammas
Xarope de papoulas brancas.....	} ana 30 grammas
Xarope de flores de laranja.....	
Agua de camphora—q. s. para fazer	
240 grammas de liquido.	

Mande para tomar uma colher de sopa de 4 em 4 horas. Agitando previamente o liquido.

Applicações e formulas do choral.—O Dr. J. Bigelow de Indianopolis communica (*American Practitioner*, Dezembro 1877) um caso de cura do tetano pela applicação topica na ferida, de cerca de quatro grammas de choral de uma só vez.

Mr. W. T. Tocher recommenda para o linimento de chloral e camphora, que tem uma poderosa applicação anti-nevralgica, a seguinte formula:

Hydrato de choral.....	} ana 30 grammos
Camphora.....	
Glycerina.....	240 grammos

Pulverise a camphora como é de costume com algumas gottas de alcohol rectificado, misture depois ao chloral, e deixe ficar a mis-

tura no gral até que se torne líquida. Passe então para uma garrafa, addicione a glicerina e agite.

O acido salycilico, novas applicações.— O Dr. J. Spinzer (*Ohio Medical Recorder*, Setembro) em um caso de erysipela idiopathica empregou topicamente 30 grãos de acido salycilico em uma onça de glicerina com resultado rapido e muitissimo favoravel.

O Dr. Grollet recommenda em um trabalho interessante as injeções de acido salycilico na leucorrhéa.

A noz vomica a nas nauseas e vomitos da prenhez.— O Dr. G. C. Smith (*Pacific Medical and Surgical Journal*) menciona o emprego vantajoso da formula séguinte:

R. Tint. de noz vomica.....	} ana 60 grammos
Solução de bismutho	

Mande para tomar as colherinhas de chá, 3 ou quatro vezes ao dia, depois da comida.

Injecções hypodermicas de morphina para prevenir o aborto.— Em sete casos de aborto imminente, o Dr. Isham de Cincinnati empregou a morphina pela bocca ou em injeções hypodermicas. Em todos os casos pararam as contracções uterinas e a hemorrhagia. Em 4 a prenhez proseguio seu curso e chegou ao termo; dos outros tres, dous tinham já o feto morto quando se fez a applicação da morphina.

Tratamento do eczema infantil.— O Dr. Allbutt, aconselha no *British Medical Journal* de 24 de Novembro na forma inflammatoria aguda, periodo exsudativo, o seguinte:

Oleo de amendoas doces.....	60 grammos
Oleo de amendoas amargas.....	20 gottas

Unja a superficie affectada duas ou tres vezes por dia.

No periodo escamoso a therebentina pode ser usada do mesmo modo. Internamente o acido nitrico diluido em doses gradualmente augmentadas conforme a idade, associado ao decocto de quina amarella, e algumas vezes oleo de figado.