

carros tuberculosos. Esta vez poderão-se facilmente distinguir os atomos corados na membrana synovial, com o aspecto, a olho desarmado, de incrustações cinzentas.

3. Quando se injectarão nos pulmões bacterias de putrefacção, morrerão sempre os animaes no intervallo de um a cinco dias. Revelava o exame da junta lesada leve exsudação sero-sanguinolenta, contendo alguns corpusculos de pus e bacterias semelhantes ás injectadas.

4. Forão obtidos os mesmos resultados injectando se bacterias obtidas por geração segmentada.

Determinou-se a mesma synovite caracteristica, inoculando-se o animal com algumas gotas do sangue de um animal, previamente infectado de tuberculose.

6. Realisou-se uma serie de experiencias sobre os remedios antibactericos; os quaes forão administrados aos animaes sob a forma de inhalações. Verificou-se invariavelmente que a inflammação assumia aspecto mais favoravel, más não que tivesse nenhum medicamento nma acção qualquer sobre o processo caseoso. Parece viverem os animaes um pouco mais, quando lhes são administrados os *antibactericos*:

Tornão evidente essas experiencias o modo porque se desenvolvem no homem, após insignificantes lesões, a inflammação escrophulosa ou tuberculosa das articulações. A tuberculose local é frequentemente devida á presença de uma veia tuberculosa ou de bacterias no sangue.

(*The London Medical Record*, 1879, n. 52.)

**Enxerto de periosteo.**—Ao recente congresso de Amsterdam communicou o Dr. Reverdin, professor em Genebra, uma tentatiya original de enxerto de periosteo de coelho, que ultimamente praticou em um caso de rhinoplastia parcial. Tratava-se de uma moça que, havia 3 annos, apresentava no dorso do nariz uma ulcera de natureza escrophulosa, que determinára finalmente perda de substancia, não só da pelle, como ainda da cartilagem do septo. Media a perforação dois centimetros quadrados de extensão e estava situada abaixo dos ossos nasaes; fora obturada, havia 2 annos, por meio de dois retalhos lateraes. A moça conservara o nariz muito aquilino e com as azas muito largas.

Fez-se uma excisão vertical do lobulo, com o fim de diminuir-se a saliencia; obtida, porém, a cura, apresentava o nariz ainda uma forte depressão no meio, e uma saliencia da extremidade, com forma de trompa e de mui desagradavel aspecto. Para obviar a semelhante defeito, tentou o Dr. Reverdin formar uma aresta de nariz, solida, e tanto quanto possivel, ossea e resistente. Neste intuito, praticou no dorso do nariz, ao nivel da antiga fistula, uma incisão vertical e duas incisões horizontaes. Dissecou dois retalhos quadrados, cujos vertices contiguos correspondião á aresta do nariz e cuja base olhava para as bochechas.

Levantando então, como as metades de uma porta, esses retalhos, que comprehendião apenas parte da espessura da parede do nariz, applicou á superficie viva ahí preparada dois retalhos espessos de periosteo, excisados da raiz do nariz de um coelho, morto nessa occasião, cobrio-os com os precedentes e fixou tudo com suturas de corda de viola e de fio de prata. Foi completo o exito do enxerto; a reunião deo-se sem obstaculos; não representarão os retalhos perioticos o papel de corpo estranho; e, ao deixar, em principio de Agosto, a operada, verificou Reverdin que já estava a cicatrização completa. Augmentou a espessura da parede nasal e se foi attenuando a depressão disforme. Pareceu que os retalhos se vão endurecendo; mas, ao fim de certo tempo, essa transformação parou. Não tendo continuado a observação da doente, não sabe Reverdin infelizmente a sorte que tiverão os retalhos transplantados.

(*Journal de Méd. et de Chirurgie Prat.*, Novembro de 1879.)

---

## VARIÉDADES

---

Carta circular da commissão para o estudo do beriberi na Bahia.—Damos hoje publicidade a uma carta circular que a commissão ultimamente nomeada para estudar o beriberi n'esta provincia julgou conveniente dirigir aos