

carne assada. — Dose : 2 a 4 colheres *de sopa* aos adultos; 2 a 4 colheres *de chá* as crianças, por dia. Cada colher *de sopa* representa 40 grammas de carne.

OLEO ESSENCIAL DE SANDALO CITRINO. Este oleo, introduzido ha poucos annos na therapeutica, emprega-se hoje em Pariz com bastante frequencia. Possui propriedades anti-blennorrhagicas incontestaveis; cura tambem o catarrho vesical. Não produz colicas, nem diarrhea como faz a copahiba. O seu cheiro aromatico passa exclusivamente pelas ourinas. Contra a blenorhagia administra-se na dose de 4 grammas por dia; contra o catarrho vesical 1 gramma. Emprega-se sobretudo em capsulas.

PELLETIERINA. Alcaloide obtido das cascas da raiz ou da casca do tronco da romeira (*Punica granatum*, L.), em 1879, pelo Sr. Tanret, pharmaceutico de Pariz. E' um liquido de consistencia oleaginosa, incolor ou levemente amarellado, volatil, de cheiro aromatico e viroso. E' um poderoso teniafugo, cujos effeitos foram verificados nos hospitaes de Pariz. Forma com acido sulfurico um sal crystallizado, branco, soluvel em agua: é o *sulfato de pelletierina*, que se emprega de preferencia na dose de 30 centigrammas para um adulto, em 30 grammas d'agua, contendo 50 centigrammas de tannino. O tannino, pela acção adstringente sobre a membrana mucosa do estomago, torna a absorpção da pelletierina menos rapida, e facilita o entorpecimento da tenia. A dose do sulfato de pelletierina, para as crianças menores de 12 annos, é de 15 a 20 centigrammas. Em dose elevada, o medicamento produz vertigens e syncopes.

Eis aqui as regras que se devem seguir na administração do sulfato de pelletierina :