

A mulher ficou sem sentidos durante dois dias, depois voltou a si e curou-se rapidamente.

O auctor diz tambem ter obtido bons resultados da pilocarpina na doença de Bright e na asthma pasmodica.

EXCISÃO DO CANCRO DO ESTOMAGO—O doente em quem o professor Billroth fez a sua primeira operação de excisão de cancro do estomago, em Janeiro passado, morreu na noite de 23 de Maio, por reproducção da doença. O tumor era um cancro colloide, que muito provavelmente tinha provindo das glandulas lymphaticas retroperitoneaes e que se espalhou por todo o revestimento peritoneal da cavidade abdominal.

A superficie externa do estomago, o colon transverso e as proporções adjacentes do duodenum e jejunum estavam tambem cobertas por cancro colloide; de modo que era difficil isolar o estomago e o duodeno. O estomago conservava a sua forma natural, de maneira que quem não soubesse da operação não imaginaria que se tinha tirado d'elle um fragmento de quatorze centimetros. Tinha o tamanho de um estomago fortemente contrahido, como frequentemente se encontram nas autopsias. O duodeno estava fixo á pequena curvatura e pensar-se-hia haver um grande diverticulo na curvatura maior. De facto, a autopsia revelou uma dilatação sacciforme na grande curvatura no ponto correspondente á incisão; esta alteração não era porem bastante para produzir perturbações digestivas. Não havia aperto na junção do estomago com o duodeno. Nos pontos em que se tinha applicado as suturas, a união era tão estreita que não havia cicatriz, e a linha de união só com difficuldade se podia achar. (*The Brit. med. journal.*)