

TRATAMENTO DA LOUCURA PELAS INJECCÖES HYPODERMICAS DE CHLORYDRATO DE MORPHINA — O Sr. Aug. Voisin publica nos ultimos numeros do *Bull. de Thérapeut.* novas observações de loucura tractada por esse methodo e conclue assim :

Em resumo, são 27 novas observações de cura de loucura; 15 doentes foram tractados em familia; e n'esses 15, 12 eram melancolicos e allucinados, 3 estavam atacados de mania hysterica.

Doze foram tractados no hospital; n'esses 12, 8 eram melancolicos e allucinados.

Quatro estavam atacados de loucura religiosa, a vesania, que é reconhecida a mais difficil de curar.

As doses maximas mais geralmente empregadas (e a que progressivamente se chegou) eram 5 a 8 centigr. por dia. Tiveram que ser levadas a 60 centigr. por dia em Mlle. B., lypemaniaca gemedora. Ora, sabe-se que esta fórma é considerada como quasi incuravel.

Terminando, affirmo que o emprego das injecções sub-cutaneas, e em particular das injecções de morphina nos alienados, dá o melhor resultado, pela certeza que tenho da administração dos medicamentos que receito.

O MICROBIO DA FEBRE TYPHOÏDE — N'uma memoria ultimamente publicada, o professor Tizzoni, de Catana, chega ás seguintes conclusões, que encontramos na *Union Médicale*:

«1.º As materias organicas insoluveis extrahidas da agua potavel por simples filtração durante uma epidemia de typhos abdominal e injectadas debaixo da pelle do cão produzem em certos casos os principaes