

Tendo sido retirados da vagina e do utero os coallios existentes, uma sonda foi introduzida na cavidade d'este orgão e uma injeção de 16 onças de perchlorureto de ferro de concentração normal foi praticada. Poucos momentos depois da injeção o utero contrahio-se gradualmente e a hemorragia diminuiu; cinco minutos mais tarde o utero estava completamente contrahido e a hemorragia tinha cessado.

A doente restabeleceo-se sem apresentar symptoma algum grave, mas ficou por muito tempo pallida e anemica. (*British Medical Journal* de 22 de Outubro de 1881 — pag. 666.)

TRATAMENTO DO RHEUMATISMO ARTICULAR AGUDO.— O Dr. Carpani, apoiando-se em numerosas observações que lhe são proprias, e no estudo dos melhores auctores sobre a materia, divide os diversos methodos de tratamento d'esta molestia nos quatro seguintes grupos, com indicações especiaes:

1.º O salicylato de soda é indicado nos casos de polyarthrite aguda febril, com manifestações articulares muito concentradas, e contra-indicado quando existem simultaneamente lesões cardiacas, perturbações nervosas ou gastro-intestinaes e molestias renaes.

2.º O bisulfato de quinina é indicado nos casos, em que o rheumatismo é uma manifestação da infecção palustre, ou quando esta lhe está associada.

3.º O acido benzoico é recommendavel, unicamente quando a nephrite complica o rheumatismo articular agudo febril.

4.º Os vesicatorios (methodo de Dechilli e Davies) são os meios mais seguros para combater o rheumatismo mono-articular, ou quando este occupa poucas articulações. (*Bulletin de Therapeutique* de 15 de Outubro de 1881;— pag. 334)