

O Governo nomeará o Secretario e mais empregados da Secretaria, bem assim, mediante uma proposta da junta, o organisador da estatística e os pharmaceuticos que houverem de servir na inspecção das boticas e drogarias. Os serventes serão de livre escolha do Presidente da Junta.

Art. 10. As commissões de hygiene publica das parochias do municipio da côrte serão compostas de membros effectivos e adjuntos, nomeados pelo Governo d'entre os medicos relacionados em uma lista, que lhe será apresentada pela Junta Central de hygiene publica.

Art. 11. Quanto ás parochias urbanas, o numero dos membros effectivos das commissões sanitarias a que se refere o artigo antecedente será: um para cada uma das parochias da Candelaria, Lagôa, Gavea e Engenho-Novo; dous para cada uma das do Sacramento, S. José, Santo Antonio, Espirito Santo, Engenho Velho e S. Christovão; tres para cada uma das de Santa Rita, Sant'Anna e Gloria. O numero dos adjuntos será o dobro do dos effectivos.

Quanto ás parochias suburbanas, as respectivas commissões serão constituídas por um membro effectivo e dous adjuntos.

( Continua )

## HYGIENE DAS ESCOLAS

Pelo Director Geral da Instrucção Publica d'esta Provincia foi nomeada uma commissão composta dos Srs. Drs. Francisco dos Santos Pereira e Antonio Pacifico Pereira e dos Srs. Professores Joaquim José da Palma, Antonio Bahia da Silva Araujo e Elias de Figueiredo Nazareth para apresentar um modelo de mobilia escolar que reúna as condições exigidas pela hygiene.

A Commissão adoptou, por proposta do Sr. Dr. Pacifico Pereira, as seguintes indicações para a construcção das mezas e bancos escolares destinados ás escolas publicas d'esta provincia:

- 1.<sup>a</sup> A meza e o banco devem formar uma só peça.
- 2.<sup>a</sup> Cada peça deve servir somente para dois alumnos.
- 3.<sup>a</sup> Cada lugar deve ter pelo menos 45 centímetros para os menores e 50 para os maiores.
- 4.<sup>a</sup> A maior differença de altura entre os meninos que se assentem no mesmo banco não deve exceder de 15 centímetros.
- 5.<sup>a</sup> A largura dos bancos deve ser tal que as nadegas e  $\frac{3}{5}$  das coxas descansem sobre elles.
- 6.<sup>a</sup> A altura deve ser tal que estando o menino sentado

formem a perna e a coxa um angulo recto, e a planta do pé descanse no chão.

7.<sup>a</sup> Todos os bancos devem ter um encosto convexo, de modo que offereça um apoio commodo á curvatura sacro-lombar da columna vertebral.

8.<sup>a</sup> O encosto deve ter uma altura tal que permita que os meninos, descansando sobre elle os cotovellos, alliviem por momentos a parte inferior do tronco do peso do corpo que ella sustenta.

9.<sup>a</sup> A distancia horisontal entra a borda anterior da meza e a do banco deve ser nulla.

10.<sup>a</sup> A taboa da meza deve ter uma inclinação de 15° e ser dividida longitudinalmente em duas partes, de modo que se possa levantar a parte anterior, affim de que os meninos possam quando seja preciso ficar em pé entre a meza e o banco.

11.<sup>a</sup> Em cada mobilia escolar haverá pelo menos 5 dimensões diversas para as estaturas correspondentes ás idades de 6 a 15 annos.

12.<sup>a</sup> Para a construcção d'estas mobílias escolares serão adoptadas as dimensões da tabella annexa.

De accordo com estas indicações foi adoptada pela commissão, depois de comparadas as dimensões dos alumnos das differentes classes das escolas primarias, a seguinte tabella do Sr. F. Narjoux para a construcção dos bancos e mezas escolares.

Os alumnos serão divididos em 5 classes, correspondendo ás estaturas seguintes: 1<sup>m</sup>,10 (1.<sup>a</sup>), 1<sup>m</sup>,11 a 1,20 (2.<sup>a</sup>), 1,21 a 1<sup>m</sup>,35 (3.<sup>a</sup>), 1<sup>m</sup>,36 a 1<sup>m</sup>,50 (4.<sup>a</sup>), e acima de 1<sup>m</sup>,50 (5.<sup>a</sup>).

Dimensões das mezas para as differentes classes :

	1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	3. <sup>a</sup>	4. <sup>a</sup>	5. <sup>a</sup>
Altura acima do solo, tomada a medida da borda anterior da meza....	0 <sup>m</sup> ,44	0 <sup>m</sup> ,49	0 <sup>m</sup> ,55	0 <sup>m</sup> ,62	0 <sup>m</sup> ,70
Largura.....	0 <sup>m</sup> ,35	0 <sup>m</sup> ,37	0 <sup>m</sup> ,39	0 <sup>m</sup> ,42	0 <sup>m</sup> ,45
Comprimento para 2 logares.....	1 <sup>m</sup> ,00	1 <sup>m</sup> ,00	1 <sup>m</sup> ,10	1 <sup>m</sup> ,10	1 <sup>m</sup> ,10

A inclinação da taboa da meza deve ser de 15 a 18 grãos, e nunca inferior a 15 grãos.

O banco será fixo, ligeiramente inclinado para diante, e terá para as diferentes classes as seguintes dimensões :

	1. <sup>a</sup>	2. <sup>a</sup>	3. <sup>a</sup>	4. <sup>a</sup>	5. <sup>a</sup>
Altura acima do solo, tomada do meio do banco	0 <sup>m</sup> ,27	0 <sup>m</sup> ,30	0 <sup>m</sup> ,34	0 <sup>m</sup> ,39	0 <sup>m</sup> ,45
Largura.....	0 <sup>m</sup> ,21	0 <sup>m</sup> ,23	0 <sup>m</sup> ,25	0 <sup>m</sup> ,27	0 <sup>m</sup> ,30
Comprimento para 3 logares.....	0 <sup>m</sup> ,90	0 <sup>m</sup> ,90	1 <sup>m</sup> ,00	1 <sup>m</sup> ,00	1 <sup>m</sup> ,00

O encosto do banco deve ser de 0<sup>m</sup>,10 de largura, ficando a aresta superior acima do assento na distancia de 0<sup>m</sup>,19 para a 1.<sup>a</sup>, 0<sup>m</sup>,21 para a 2.<sup>a</sup>, 0<sup>m</sup>,24 para 3.<sup>a</sup>, 0<sup>m</sup>,26 para a 4.<sup>a</sup>, e 0,28 para a 5.<sup>a</sup> classe.

## REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

MICROBIOS NA FEBRE AMARELLA, por Capitan e Char-  
rin — O Dr. Monard, medico civil, tendo expontanea-  
mente partido para o Senegal, com o fim de cuidar dos  
atacados de febre amarella, acaba de enviar ao labora-  
torio de pathologia geral da Faculdade de Medicina  
productos originarios de individuos affectados d'essa  
molestia e principalmente constituídos por porções  
de urina e sangue recolhidas em tubos purificados que  
lhe remettera, com as instrucções necessarias, o  
laboratorio. Um certo numero d'estes tubos continha  
caldo depois de ter soffrido as operações necessarias  
para verificar sua pureza. O Dr. Monard poude não só  
recolher liquidos organicos, mas ainda inseminar os  
caldos preparados introduzindo algumas gottas d'este  
liquido directamente e sem intermediario algum.

Isolados os tubos, provenientes de doentes vivos ou  
de cadaveres, duas horas, no maximo, após a morte,  
poderão ser estudados com algumas garantias. As  
culturas de sangue parecem puras; n'ellas demonstra-se  
apresença de numerosos microbios, em geral moveis,  
— as mais das vezes micrococcos, ora isolados sob