

CASO DE CYSTICERCUS INTRAOCULARIS, pelo Dr. E. Vogler — N'uma menina de 23 annos fez-se a enucleação do olho esquerdo, de que tinha cegado ha quatro mezes e que estava inflammado ha tres dias. Era a imagem do olho de gato amaurotico (reflexo amarellado de latão na pupila), sem poder fazer diagnostico mais exacto.

O exame do olho mostrou a retina descolada em forma de fuil, no meio do qual havia uma cavidade, com paredes lisas. Dentro desta estava um cysticerco de 8 millimetros de comprido com a cabeça sahida. A cavidade estava no corpo vitreo amarellada, condensada por tecido cellular. A retina estava n'um sitio presa na choroidea. Esta ultima infiltrada com sangue e separada da sclerotica. Exames de taes olhos não são frequentes. O autor menciona ainda dezeseis casos. Déz vezes estava o parasita debaixo da retina; quatro vezes justamente diante d'ella, uma vez no corpo vitreo, uma vez falta detalhe mais detido. Por consequencia o estar do cystecercos no meio do corpo vitreo, como mostrou o exame, neste caso, é relativamente raro.

DIAGNOSTICO DA AMBLYOPIA NICOCIANA, por E. Nettleship — O symptoma principal é a limitação do alcance de vista central, ficando a vista peripherica intacta, isto durante toda a marcha da doença. Um doente com amblyopia nicociana guia-se com facilidade. Elle evita os obstaculos, não dá encontrões, vê melhor no crepusculo e de manhã enxerga mal tendo a luz forte, visto que então tem de estreitar-se muito a pupilla. Estando por acaso a iris paralyzada, então falta este symptoma na amblyopia nicocianica. O scotoma central, caracteristico d'esta amblyopia, não é absoluto, mas sim relativo: os doentes não mencionam isto por si tão exactamente, como, por exemplo, alguém que tenha tido uma hemorrhagia no sitio da mancha amarella; só indicam isto de leve si por exemplo no ler procurar primeiramente a posição na qual conhecem bem a leitura.

A forma do scotoma é ovada indo da mancha amarella para a pupilla e fóra d'esta. Quanto maior fór o scotoma tanto maior é a vista, apesar do tamanho não acompanhar a intensidade parallelamente. O scotoma é sempre symetrico em ambos os olhos. Tem tendencia de estender-se para fóra, raras vezes para dentro. O descobrir do scotoma dos doentes com amblyopia