

emprego se colhe no tratamento da blennorrhagia, são incontestáveis.

Zeissl affirma, porém, que o uso de uma solução fraca, assim formulada — Permanganato de potassa 1 centigramma, agua 100 grammas; — é desprovida de toda a acção caustica, contem a adstringencia necessaria para attingir ao fim desejado, como teve alli muitas occasiões de se convencer.

Deve-se attribuir, naturalmente, em grande parte, a efficacia do permanganato de potassa a suas propriedades antisepticas.

(Revista hebd. de therapeut. — Traduzido do *Progrès Medical* de 22 de Julho de 1882.)

AMBLYOPIA NA MULHER, PRODUZIDA PELA NICOTINA—O Dr. Shorten de Noruega refere dois casos de amblyopia por intoxicação pela nicotina, observados em duas mulheres.

1º E. E. com 51 annos de idade apresenta-se queixando-se de que sua vista havia consideravelmente diminuido desde o ultimo anno.

Examinando-se o campo visual por meio de papeis corados, de 2 centímetros quadrados, mais ou menos, pode-se demonstrar no ponto de fixação e em sua immediata visinhança uma parte pouco larga e em que as cores não eram distinctas.

Interrogada a doente se fumava, respondeu affirmativamente, tendo começado a fazel-o por causa de uma tosse e dizendo que ordinariamente se serve de fumo cortado para mascar.

Prescreveu-se a abstinencia completa do fumo, o iodureto de potassio e a electricidade e no fim de um mez a vista tornou-se melhor.

2º — S. B. com 62 annos : amblyopia central.

Começara a doente a sentir, decorriam já mais ou menos 4 semanas, que perdia-se e enfraquecia-se rapidamente a vista; não podia trabalhar, lhe era difficil orientar-se na rua e, não

podendo explicar o que se passava, julgava ser devido talvez ao grão fraco de suas lunetas.

Tornando-se maior a nuvem que obscurecia-lhe a vista procurou os soccorros da medicina.

Pelo exame com o ophtalmoscópio nada se notava de anormal; os meios refrangentes estavam bem claros.

Interrogada se fumava declarou que sim—ha 5 ou 6 annos, porém somente 3 charutos, de fumo, é verdade, muito forte, por dia.

Por meio de papeis corados (exame perimetrico) observa-se um scotoma central em ambos os olhos.

Queixa-se ainda a doente de quasi constante dor de cabeça, com sensações dolorosas nas temporas e de cardialgia.

A abstinencia completa do fumo lhe foi prescripta.

No fim de um mez, mais ou menos, existia ainda o campo do scotoma, porém muito menor e mais claro. (R. d'ophtalmologia, Abril de 1882.—Trad. da Revista opht. do Jornal das sciencias medicas de Lille, de 5 de Agosto de 1882.)

MEDICINA ANECDOTICA

CORVISART E NAPOLEÃO I

Tendo por emquanto renunciado ao divorcio, mas apertado pelo desejo de ter um herdeiro, o imperador perguntou a sua mulher se annuia a aceitar um que fosse d'elle só, e a fingir uma gravidez com habilidade capaz de enganar a toda a gente...