

GAZETA MEDICA

DA BAHIA

PUBLICAÇÃO MENSAL

Anno XIV

NOVEMBRO, 1882

N. 5

HELMINTHOLOGIA

NOVO PARASITA

O Dr. P. Manson, de Amoy (China), acaba de descobrir um parasita novo na sciencia por occasião de praticar a autopsia em um individuo que succumbira depois da ectomia escrotal.

Na *Lancet* de 14 de Outubro ultimo vem publicada a narração do caso pelo proprio Dr. Manson. O paciente era um chinez que ha alguns annos soffria da molestia elephantoide do escroto que os cirurgiões inglezes denominam *lymph-scrotum*, com frequentes e abundantes perdas de lymphá leitosa, chegando a quantidade a algumas libras por dia; a lymphá continha microfilarias, que tambem foram encontradas no sangue extrahido de um dedo da mão.

Não havia elephancia das pernas, nem tão pouco accusava o doente haver soffrido de chyluria.

Era tal a perda de lymphá pelas vesiculas do escroto que o Dr. Manson apressou-se em extirpar o tumor antes que o doente morresse esgotado.

A operação, porém, não obstou a que elle fallecesse algumas semanas depois exausto por uma dysenteria, apezar das boas condições em que se achava a ferida.

A autopsia foi feita na tarde do dia do fallecimento (que foi

pela manhã), e nas alterações notadas no citado artigo encontramos as seguintes :

— Alguns parasitas, em numero de doze, foram achados na fascia sub-peritoneal perto das fossas iliacas, e por detraz dos rins; outro egual estava solto na cavidade da pleura direita. Alguns d'estes parasitas estavam enroscados á maneira de nós frouxos, e outros jaziam estirados.

Sendo extrahidos de debaixo do peritoneu executavam movimentos languidos como os da tenia. A sua configuração era semelhante á das solitarias, tendo de doze a quatorze pollegadas de comprimento, um oitavo de pollegada de largura, e cerca de 1/64 de pollegada de grossura; a côr era de um branco amortecido; as extremidades eram um pouco mais grossas dn que o corpo, e arredondadas. Uma vista rapida ao microscopio mostrou que uma extremidade era provida de labios, e a outra apresentava uma estreita fenda longitudinal.

Além d'estes vermes o Dr. Manson encontrou filarias no sangue dos pulmões, e duas lombrigas adultas, do sexo feminino, dentro do bronchio esquerdo, para onde penetraram por uma abertura de communicação entre elle e o esophago, que estavam adherentes, achando-se este ultimo ulcerado, espesso, e estreito ao nivel da adherencia (o aperto do esophago tinha sido suspeitado em vida).

O jornal citado accrescenta em uma nota, que aquelles parasitas teniformes foram submettidos ao exame do eminente helminthologista de Londres, o Sr. S. Cobbold, para a competente identificação, e que este não só os declarou nòvos na sciencia, como tambem pertencerem ao genero *Ligula* que não constava até agora que infestasse o corpo humano.

Em honra do descobridor, o Dr. Cobbold propoz merecidamente denominar *Ligula Mansoni* o novo parasita.

Segundo o proprio Cobbold, e outros helminthologistas as *Ligulas* (da ordem dos Cestoides) infestam certas especies de peixes, mas no estado immaturo, e d'elles passam para as

aves aquáticas que os comem, e n'ellas se desenvolvem até á maturidade sexual.

De onde provieram as que o Dr. Manson encontrara no caso acima referido, é o que se não pode averiguar, mas por analogia é permittido conjecturar que proviessem de origem semelhante á das que infestam as aves aquáticas, isto é, por ingestão de peixes que as continham em estado immaturo, ou de agua inquinada com os respectivos ovulos. Ha, porém, ainda a considerar que nas aves estes vermes occupam os intestinos, e no caso vertente foram encontrados fora d'elles, no tecido areolar sub-peritoneal, circumstancia que augmenta a difficuldade da explicação do processo migratorio.

Como quer que seja, á sciencia helminthologica é enriquecida com mais um facto importanté devido aos fecundos estudos do Dr. Manson.

OBSTETRICIA

DYSTOCIA POR OCCLUSÃO DA PARTE SUPERIOR DA VAGINA

INCISÃO DO SEPTO, VERSÃO, EXTRACÇÃO DO FETO VIVO

Pelo Dr. A. PACIFICO PEREIRA

Em 21 de Outubro de 1882, ás 11 horas do dia, fui chamado, com o meu distincto collega o Sr. Dr. Americo de Sousa Marques, para ver a Sra. P. que se achava em trabalho de parto desde a manhan anterior.

De 30 annos d'idade, altura regular, boa constituição, a Sra. P. déra á luz dois annos antes uma criança de termo, tendo porém, segundo informou-nos, soffrido no estado puerperal uma inflamação das partes profundas da bacia, que