

faculdades mentaes e se curara inteiramente desde que começara a expellir lombrigas.

O meu doentinho, ao exame externo, apresentava grande pallidez amarellada da pelle, pulso cheio, andar vacillante, olhar sem expressão; emquanto aos olhos existia uma mydriase pronunciada, nenhum augmento da tensão intra-ocular, nenhum outro qualquer phenomeno digno de menção.

Procedendo ao exame ophthalmoscopico, depois de reconhecer que a função visual, se não abolida, estava comtudo profundamente perturbada, encontrei excessiva pallidez dos vasos retinianos, sobretudo as veias, e mais pallida ainda que a retina a papilla do nervo optico.

Com uma certa doença de retina, poderia até certo ponto comparar-se (não digo confundir-se) a affecção em questão: refiro-me á retinite leucemica; faltavam porém as pequenas manchas irregulares na região da mancha amarella, symptomas que, com os acima apontados, nos auctorisam o diagnostico da retinite ligada á leucocytemia.

Em conformidade pois com o resultado do exame a que procedi e das informações fornecidas pela familia, receitei umas pilulas de calomelanos e santonina, pedindo ao pae do doente me desse parte da cura quando esta se tivesse alcançado.

Não era decorrido um mez e eu recebia uma carta em que se me annunciava o completo restabelecimento da visão.

Do ENOPHTHAMO, pelo Dr. Talko — Segundo este auctor, a retracção do globo ocular dá-se nas seguintes circumstancias.

1.^a No microphthalmo, adquirido ou congenito, quando o involucro da orbita não seja anormal;

2.^a Após certas doenças graves, jamais a cholera-morbus, nos velhos depois da retracção rapida e continua do tecido gorduroso

da orbita (Hinly addiciona a consumpção e as discrasias graves);

3.^a Em seguida ás adherencias inflammatorias entre o olho e as paredes da orbita;

4.^a Nos casos em que um neoplasma empurra o olho de diante para traz;

5.^a Após certos traumatismos;

6.^a A tracção do globo ocular observada sobretudo nas pessoas hypnotisadas. O autor a explica admittindo uma paresia ou um espasmo das fibras musculares, lesão do globo e das palpebras;

7.^a Observa-se a retracção do globo nos animaes, principalmente nos herbivoros em que ella se dá mediante o musculo retractor destinado a recolher o globo ocular na orbita quando o animal come tendo a cabeça baixa;

8.^a Tordym já em 1738 observou um enophthalmo derivado de forte hemicrania. — (*Bollettino d'ocul.* Agosto 1882. *Archivo Ophtalmotherapico de Lisboa.*)

O METHODO HYPODERMICO (National Med. R.) — Lista das molestias em que se tem empregado com vantagem esse methodo: *Urticaria*. Solução saturada de sulfato acido de sodio, injectado directamente nas partes doentes. — *Hemoptysia*. Acido esclerotinico, em vez d'ergotina, 5 % em injectões no pescoço ou nos braços. — *Tumor*. Injectão na substancia do tumor, pouco antes de se operal-o, de 2 1/2 centigrs. de morphina e 1 1/2 milligr. de atropina. — *Envenenamento pelo chloroformio*. Injectão de meio milligr. de digitalina, seguida, uma hora depois, de outra da mesma dose de atropina. — *Erysipela*. 8 a 10 injectões em torno da parte doente, de acido phenico em solução de 3 %. O acido salicylico tem as mesmas propriedades. — *Carcinoma*. O acido acetico, misturado com agua (3 %), dá bom resultados, fazendo contrahir