

pequenos hospitaes que existem nas provincias e pelos quaes a pobreza tem repugnancia. Foi por differentes vezes deputado provincial. Era socio de diversas sociedades litterarias e scientificas e condecorado com o officialato da Rosa.

Traçando estas linhas desejo apenas prestar uma fraca homenagem a um collega distinctissimo pelo seu saber e que trabalhou tão indefessamente pelo progresso da medicina brasileira.

A posteridade que é sempre recta nos seus juizos não recusará á memoria do Dr. Aquino da Fonseca os merecidos elogios.

Bahia, Janeiro de 1883.

Dr. J. REMEDIOS MONTEIRO.

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

De alguns novos medicamentos

ACIDO CATHARTINICO — Corpo quasi destituido de sabor, extrahido das folhas de sene e soluvel n'agua, *purgativo* na dose de 25 a 40 centigr para os adultos e 12 a 20 para as crianças.

COLOCYNTHIDINA E CITRULLINA — Dous productos, retirados da colocynthida, sendo o primeiro uma glucoside e o segundo um corpo resinoide e ambos purgativos muito energicos já na dose de 5 a 10 milligrammas.

HYOSCINA — Tem sido estudados pelo Professor Ladenburg o bromhydrato e o iodhydrato deste novo alcaloide do meimendro negro. A hyoscina, como a atropina, dilata a pupilla e mui provavelmente com maior energia, e a esta substancia quasi completamente se assemelha sob o ponto de vista de suas propriedades therapeuticas. Não deve ser confundida com a hyosciamina do commercio, que é apenas um bom extracto pharmaceutico.

PAPAYOTINA — Este producto, extrahido do succo da carica papaya, peptonisa duzentas vezes seu peso de fibrina do sangue, fresco e livre, por pressão, de seu excesso de humidade.

PODOPHYLLOTOXINA — Preparado resultante, segundo o Dr. Podwysotsky, da combinação do principio activo e crystallisavel do Podophyllum pectatum com um acido resinico da mesma raiz. Preferivel á podophyllina, cuja composição variavel produz effeitos purgativos muito incertos, deve ser administrado de preferencia em um liquido alcoolico, na dose de 15 milligr. para um adulto e 0,5 a 5 milligr. para as crianças. Empregado como purgativo em mais de uma dose, a segunda só deve ser dada oito ou dez horas após a primeira.

TANNATO DE CANNABINA — Novo soporifico experimentado com felizes resultados pelo Dr. Fronmuller.

O Dr. Hiller, de Berlim, tem experimentado o emprego, como purgativos e por meio de injeções subcutaneas, do acido cathartnico, da colocynthidina e da citrullina

Igualmente tem elle empregado a aloina, a evonymina (glucoside do Evonymus purpureus) e a baptisia (do baptisia tinctoria).

Estes medicamentos eram administrados em dissolução em uma mistura de partes iguaes d'agua, de alcool e de glycerina. Uma injeção de 20 centigr. d'aloina provoca, no fim de quatro a seis horas, diarrhéas copiosissimas e de colocynthidina bastam 5 a 10 milligrammas para produzir-se effeito purgativo energico, acompanhado porem de dor.

Estas injeções são infelizmente, entretanto, mui dolorosas e seguidas de abcesso e edema. (Transcripta e traduzida do *Jornal de ciencias medicas* de Lille, de Novembro de 1882.)

DA ANESTHESIA PROGRESSIVA DE CROUP POR ANEMIA (Congresso de la Rochelle, Secção de ciencias medicas) — O Dr. Petit (L. H.) lê as conclusões da memoria, com este titulo dirigida pelo Dr. Bouchut, medico do hospital de crianças enfermas :