

e Agosto de 1882 a comunicação do notavel professor. Muito estimamos ver confirmadas pelo nosso sabio mestre as nossas idéas sobre o *abus precatorius*.

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

MOLESTIAS CONTAGIOSAS DAS CRIANÇAS — DURAÇÃO DO ISOLAMENTO—A 20 de Abril passado o Ministro da Instrucção Publica escrevera a Academia de Medicina, perguntando: «qual o tempo que um alumno acommettido de uma molestia contagiosa, deveria ficar ausente e longe de seus collegas»?

Na secção de 18 de Julho, o Dr. Hillairet leu a resposta que a Academia deveria dar ao Ministro.

Eis como o relator dessa commissão se exprime:

As molestias contagiosas são, segundo Hillairet: a variola, a varicelle (bexigas doudas), a escarlatina, o sarampão, a diphteria e as parotidites.

A variola tem um periodo prodomico de 3 a 4 dias; o periodo da erupção é de quatro a cinco, o da suppuração das pustulas de tres a quatro, depois vem o periodo de descamação, que não tem limites bem precisos; assim pois para os casos de variola, pode-se fixar o tempo do isolamento, na media: 40 dias.

A bexiga douda, que tem uma marcha algumas vezes muito irregular, pode ter em muitos casos uma duração de dez a doze dias. É necessario mais algum tempo para a queda das crostas o que pode dar-se maximo de oito a dez dias; donde o isolamento deverá durar 25 dias.

Na escarlatina, o periodo de invasão é de 6 a 48 horas; excepcionalmente dura 3 dias. A erupção se effectua no 5º ao 6º dia (alguns pretendem que seja no 8º), a descamação

começa ao 14° a 15° dia, e dura mais ou menos de 15 a 26 dias. Assim pois um tempo de 40 dias é o quanto é bastante para um isolamento nestes casos.

O sarampão tem prodornos que duram de trez a quatro dias na média, muitas vezes porém duram de 6 a 8 dias e mesmo 12. A erupção se effectua entre as 12 e as 48 horas, depois começa declinar durante quatro dias, a descamação dura de 8 a 15 dias. O tempo de 40 dias é o sufficiente.

As parotidites duram na média 6 dias, nos casos benignos a convalescença é de 6 a 7 dias, até o desaparecimento completo da tumefacção das parotidas. Se existir qualquer outra complicação metastatica, esta dura ainda em geral mais nove dias. O espaço de tempo necessario para o isolamento das crianças, é 25 dias.

Quanto a diphteria, o tempo é muito variavel, mas por prudencia deve-se reter as crianças isoladas por quarenta dias.

D'estes dados clinicos, o relator propõe ao Ministro em nome da commissão a adopção das seguintes medidas :

1.º Os alumnos ou estudantes atacados das affecções acima deverão ser restrictamente isolados dos companheiros.

2.º O tempo necessario que este isolamento deve durar, é de 40 dias para a variola, o sarampão, a scarlatina e a diphteria; e de 25 dias para a varicelle e as parotidites.

3.º O isolamento será conservado, até que o convalescente tenha tomado o seu respectivo banho.

4.º As roupas que o menino tiver sobre si no momento de ser atacado da molestia deverão ser passadas em uma estufa, cuja temperatura seja de 90° e submettidas depois ás fumações sulfurosas; é ainda melhor lavadas.

5.º Os objectos da cama, o cortinado, o quarto, os moveis

e as paredes, enfim tudo que estiver no quarto do doente, deve ser lavado bem, desinfectado e depois posto ao ar.

6.º O alumno que fôr accommettido de uma das molestias acima estando fóra do estabelecimento de educação, deverá trazer, no momento de sua reentrada, um certificado do seu medico assistente, attestado este que deverá satisfazer ás prescripções exigidas acima.

(Revista de Medicina.)

DENTIFRICIO ANTIPUTRIDO.—As seguintes preparações são indicadas por Magitot no *Diccionario encyclopedico* como uteis, isoladas ou associadas a outros dentifricios, em certos estados fetidos da bocca, com ou sem lesão apreciavel.

I

Silicato de potassa	2 grammas
Agua	1000 »
Thymol	1 »

II

Borax	2 grammas
Agua	1000 »
Thymol	1 »

LAPIS DE IODOFORMIO.—Tem sido preconisado como meio de curativo em certas condições particulares, especialmente nos tractos fistulosos, o emprego do iodoformio.

Para este fim tem sido indicadas diversas formulas, tendo, porém, todas ellas o inconveniente de exigirem uma preparação longa e difficil.

De conformidade com o *Repertorio de Pharmacia* existe o seguinte processo muito pratico, que tem satisfeito ás experiencias feitas por diversas vezes: Toma-se—Iodoformio—3 grammas; Gomma adragante—10 centigrammas; Glycerina—2 gottas; agua destillada—3 gottas: faz-se uma massa pilular e