

25 a 30 minutos antes da anesthesia, realisada ordinariamente com o ether, que, n'estas condições, actua pelo menos tão depressa como o chloroformio, conservando aliás toda a sua innocuidade.

O tempo necessario para obter completa anesthesia, que permitta começar-se a operação, varia de 3 a 7 minutos. Segundo as observações de Sédillot, o tempo exigido pelo chloroformio só, orça por 9 minutos.

Mais notou o sr. P. Aubert que os doentes quasi não mostram repulsão para as primeiras inhalações do ether; pelo menos não observou, nem uma vez sequer, a excitação inicial que costuma ser determinada por aquella repulsão. Tambem não se lhe deparou nem um caso em que houvesse vomitos durante a anesthesia ou durante a operação.

Os doentes em que fez essas observações eram todos novos, alguns alcoolicos, e achavam-se em boa disposição geral, como costumam tel-a a maioria dos individuos que povoam as enfermarias de doenças cutaneas e venereas. E é importante de saber-se isto, pois as condições de mocidade e de saude constituem causas de resistencia á anesthesia

Terminando o seu interessante artigo, o sr. P. Aubert lembra que a associação da atropina á morphina póde aproveitar em casos mesmo em que não haja de empregar-se a anesthesia; exemplo: nos casos em que se trata apenas de calmar uma nevralgia. Essa pratica tende hoje a vulgarisar-se em Lyon, onde se tem notado que os incommodos, que costumam seguir-se ás simples injecções de morphina (desfallecimento, nauseas, vomitos), deixam de dar-se quando simultaneamente houver sido injectada a atropina. (*A Medicina Contemporanea*).

AVERIGUAÇÃO POR MEIO OPERATORIO DO SEXO DE UM HEMAPHRODITA—N'uma memoria inserida na *Gazeta Medica Italiana-Lombardia* o Professor E. Porro dá conta de uma observação

curiosa, em que, para se averiguar com segurança do sexo de um hemaphrodita, se recorreu ao canivete.

Trata-se de um individuo, que até os 15 annos foi reputado mulher; houve então suspeitas do verdadeiro sexo, porem só aos dezoito, em presença de uma proposta de casamento, foi consultado um medico que reconheceu o sexo masculino.

Por causa do recenseamento militar a familia continuou a occultar o verdadeiro sexo da pessoa observada, porém ella, considerando-se homem, pediu aos 23 annos um exame decisivo para poder reformar a sua inscripção no registro civil.

Submettida á observação do Dr. Porro, este observou-a cuidadosamente e chegou aos seguintes pormenores, que muito resumidamente extractamos :

Altura 1^m,59; peso 51^k,400. Cabellos negros e abundantes; muito poucos pellos no labio superior e nas faces. Voz de timbre masculino, pescoco secco, larynge saliente, thorax magro, achatado de diante para traz; mammas de typo feminino, bem desenvolvidas; bico pequeno, não erectil, areola rosada, de 3,5 centimetros de diametro. Ventre chato, membros superiores seccos, sem pellos, não arredondados; os inferiores convergem nos joelhos, perna secca, com poucos pellos. O conjuncto do esqueleto é masculino; a bacia tem uma grande capacidade, porém a sua altura é maior que nas mulheres, o sacro menos arqueado e menos largo, a inclinação total é maior e quasi não ha curvatura sacro-lombar; a arcada publica é apertada, de bordos lisos e não revirada para fóra. O coccyx está perfeitamente soldado ao sacro

Monte de Venus pouco proeminente, com pellos asperos, dispostos segundo um triangulo de base para cima. Fechadas as coxas, não se descobre nenhuma parte dos orgãos genitales, porém affastando-as encontra-se uma vulva com um clitoris mais desenvolvido que o normal, e cuja glande sae de um capuz

na extensão de 1,5 centímetros. Em baixo dois bordos retalhados continuam-se com as azas lateraes do capuz, de modo a simular os pequenos labios; abertos estes bordos vê-se que constituem um meio canal, de 4 centímetros de extensão e terminando n'uma abertura que conduz á bexiga. Envolvendo os órgãos genitães descriptos, estão os grandes labios, em cuja parte mais alta para a região inguinal, existem dois corpos arredondados, indolentes á pressão e que é possível fazer descer.

O toque rectal não faz descobrir qualquer órgão mediano por traz da bexiga—prostata ou utero.

Na urina da noite não se encontraram espermatozoides e parece não ter sido possível examinar o producto de polluições nocturnas, que algumas vezes tinha havido.

Apesar de que as probabilidades se inclinassem mais para se admittir o sexo masculino, o Dr. Porro não quiz decidir a questão sem uma averiguação mais profunda. Para isso incizou a prega genito-crural direita e, descoberto o corpo n'ella contido, verificou-se ser um testiculo, em que todavia o epididymo era pouco pronunciado; a presença do cordão spermatico foi egualmente verificada, o que constituiu, diz o auctor, um elemento precioso, porque, quando se abriu a vaginal, os retalhos d'esta tunica, continuando-se com o cordão, simulavam os caracteres proprios da trompa de Fallopio. A ferida cicatrisou com a maior facilidade; tinha-se empregado o penso antiseptico. (*A Medicina Contemporanea.*)

SUCCEDANEO DO OLEO DE BACALHAU — Para as creanças, que recusam absolutamente o oleo de fígado de bacalhau, um medico de Montmartre, o Dr. Larmande, tem recorrido á acção tonica da glicerina, recommendando a seguinte formula :

Glicerina pura	300 grammas
Tintura de iodo	30 gottas.
Iodureto de potassio	30 centigrammas