

na extensão de 1,5 centímetros. Em baixo dois bordos retalhados continuam-se com as azas lateraes do capuz, de modo a simular os pequenos labios; abertos estes bordos vé-se que constituem um meio canal, de 4 centímetros de extensão e terminando n'uma abertura que conduz á bexiga. Envolvendo os órgãos genitães descriptos, estão os grandes labios, em cuja parte mais alta para a região inguinal, existem dois corpos arredondados, indolentes á pressão e que é possível fazer descer.

O toque rectal não faz descobrir qualquer órgão mediano por traz da bexiga—prostata ou utero.

Na urina da noite não se encontraram spermatozoides e parece não ter sido possível examinar o producto de polluções nocturnas, que algumas vezes tinha havido.

Apesar de que as probabilidades se inclinassem mais para se admittir o sexo masculino, o Dr. Porro não quiz decidir a questão sem uma averiguação mais profunda. Para isso incizou a prega genito-crural direita e, descoberto o corpo n'ella contido, verificou-se ser um testiculo, em que todavia o epididymo era pouco pronunciado; a presença do cordão spermatico foi igualmente verificada, o que constituiu, diz o auctor, um elemento precioso, porque, quando se abriu a vaginal, os retalhos d'esta tunica, continuando-se com o cordão, simulavam os caracteres proprios da trompa de Fallopio. A ferida cicatrisou com a maior facilidade; tinha-se empregado o penso antiseptico. (*A Medicina Contemporanea.*)

SUCCEDANEO DO OLEO DE BACALHAU — Para as creanças, que recusam absolutamente o oleo de figado de bacalhau, um medico de Montmartre, o Dr. Larmande, tem recorrido á acção tonica da glicerina, recommendando a seguinte formula :

Glicerina pura	300 grammas
Tintura de iodo	30 gottas.
Iodureto de potassio	30 centigrammas

Uma colher um quarto de hora antes de cada refeição.

Com este preparado o appetite volta e a constipação desaparece completamente. Para as pessoas delicadas modifica o autor a formula anterior da maneira seguinte :

Glycerina pura	250 grammas
Xarope de framboesas	50 grammas
Tintura de iodo	30 gottas
Iodureto de potassio	30 centigrammos

(Da *União Medica.*)

TRATAMENTO DA URTICARIA — O sulphato de atropina tem sido incluído no numeroso conjuncto dos meios conhecidos pelos dermatologistas para o tratamento da urticaria. O Dr. Schwimmer de Pesth, administra esta substancia debaixo da fórma pilular, contendo cada pilula cinco milligrammas deste sal, dando uma de manhã e outra á noite. O autor deste novo processo cita varias observações, em que os accidentes da urticaria teem cedido no segundo ou terceiro dia de tratamento pelo sulphato de atropina. Dr. A. Planellas. (*Enciclop. Med. Farm.*)

NOVO HEMOSTATICO — Um preparado, feito por Carlos Pavesi, tem alcançado uma bem merecida reputação, e consiste em 25 partes de acido sulpho-carbolico, outras tantas de alcool, 5 de acido benzoico, 5 de acido tannico, 25 de glycerina e 200 de agua de rosas.

Prepara se o acido sulpho-carbolico misturando uma parte de acido sulphurico e uma e meia de acido carbolico, aquecendo a mistura a b. m. durante alguns minutos; dissolve-se o acido benzoico no alcool com a glycerina, e o acido tannico em agua. A mistura é clara de cor de palha, tem sabor acido, não é caustica, nem irritante, e coagula a albumina, o leite e o sangue. (*Rest. Farm.*)