

o paciente será prevenido para observar estritamente as instrucções dadas para seu uso. É um irritante poderoso e a sua acção sobre a pelle estende-se consideravelmente além das partes a que se applica. É vantajoso em muitos casos principiar o tratamento com a pomada, contendo 5 por cento de acido. Em todos os casos é necessario evitar cuidadosamente a immediata vizinhança das palpebras, que de outro modo podem edemaciar-se.

CONTRA A ATONIA GASTRO-INTESTINAL — Segundo a *Revista Italiana de Terapia*, Germain Sée recommenda o seguinte tratamento d'aquella fórma de dispepsia. Referida á *Pharm. Port.*, a formula é :

R. ^e — Oxydo de magnesio	} aã 30 grammas
Carbonato de cal	
Calumba em pó	2 »
Baunilha em pó	1 »

M. s. a.

Usa-se uma colher das de café antes de cada refeição. Em certos casos ajuntam-se 5 a 40 gottas de tinctura de noz-vomica em uma colher de café no fim da comida. Dar-se-hão purgantes salinos de quando em quando. É bom adjuvante o uso dos duches sulphurosos e da electricidade. (*Coimbra Medica*).

ACCIDENTES CARDIO-PULMONARES CONSECUTIVOS A DESARRANJOS GASTRO-HEPATICOS — Eis as conclusões de uma interessante memoria publicada nos ns. de janeiro e. fevereiro do presente anno da *Revue de médecine* :

1.^o Certos estados dyspepticos, que teem sua origem no estomago, no intestino ou nas vias biliares, repercutem-se no apparelho cardio-pulmonar e dão logar a phenomenos morbidos que se podem agrupar em quatro fórmas clinicas: *a.* Na primeira fórma, só o coração está interessado e ha palpitações ou intermittencias. — *b.* A segunda fórma é caracterisada por accidentes que interessam ao mesmo tempo o pulmão e o coração, do lado do pulmão : oppressão mais ou menos viva, podendo