

dades usuaes da Capitania do Rio Negró, por Antonio José d'Araujo Braga, 1786, onde o seu auctor falla no Beriberi.

Pelo relatorio do Cirurgião Braga e pela carta que nos dirige o nosso illustrado comprovinciano Sr. Dr. Aurelio de Lavor vemos que o Beriberi já existia no Brazil desde o século passado; e no entretanto só de 1863 para cá é que começou-se o seu estudo, sendo o seu iniciador o respeitavel clinico bahiano Sr. Dr. Silva Lima.

(Continúa).

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

HYGIENE DAS ESCHOLAS — O distincto physiologista Professor Pfluger fez recentemente em Berne uma conferencia sobre os efeitos que a leitura e a escripta produzem na força visual das crianças, e citou o facto, de consternadora eloquencia, de soffrerem defeito da visão mais de metade de 45000 crianças examinadas n'Allemanha. Em algumas escholas a proporção dos myopes ascendia a 70 e 80 %, e no Gymnasio de Heidelberg todos os rapazes da eschola tinham má vista. Este lamentavel estado de cousas provém, segundo o illustrado Professor, da insufficiencia de luz nas salas escholares, da má impressão, do mau papel, do methodo vicioso de escrever, da má disposição dos bancos e carteiras. Uma das causas mais poderosas da visão defeituosa é ainda o sobrecarregar as crianças de muitas lições e restringir portanto as horas de recreio. A posição viciosa das crianças no acto de escrever exerce ainda uma influencia muito desfavoravel sobre a vista.

Uma commissão nomeada pelo Governo de Wurtemberg, composta de tres mestres d'escola e tres medicos, verificou que é comparativamente pequeno o numero de crianças que escrevem com o dorso curvado para o lado esquerdo; oitenta por cento se montém durante a escripta na inclinação para a direita, produzindo uma elevação permanente do hombro direito, que tende a produzir a curvatura da espinha.

Nas escholas que visitaram os commissionedos acharam 20 % no sexo masculino e 30 a 40 % no sexo feminino soffrendo de curvatura mais ou menos pronunciada da espinha devida a esta causa. A differença entre os dois sexos é provavelmente devida ao facto de serem os rapazes mais activos nos exercicios physicos, e andarem mais confortavelmente vestidos. Quanto á posição no acto de escrever, a distancia entre a meza e os olhos deve ser de cerca de 25 centimetros (10 pollegadas approxima-damente); e era raro encontrar a commissão uma criança que podesse escrever conservando os olhos a esta distancia do papel. A muitas era necessario approximar o rosto a 7 centimetros do caderno da escripta. A conclusão geral da commissão e do Professor Pfluger, é que de todos os males enumerados o peor e o que exige a mais urgente reforma é o que provém das mezas e bancos escolares, actualmente em uso. (*British Med. Journal.*)

VACCINAÇÃO E REVACCINAÇÃO DAS MULHERES GRAVIDAS.—Quando a variola, principalmente na fórma confluenta, acommette as mulheres, durante a gestação, um symptona que de ordinario apparece, é a metrorrhagia, a que se segue o aborto ou o parto prematuro e a morte.

Serres conta que, de 27 mulheres gravidas, atacadas de variola, admittidas em 1832 no hospital da Piedade em Paris, 22 abortaram e todas falleceram, menos uma. Outros auctores fallam de casos de variola, dando logar ao aborto.

O sr. Hervieux assistiu a 3 partos prematuros, durante a incubação da variola, todos seguidos da morte das puerperas. É pois incontestavel a acção da variola sobre o orgão da gestação.

Contou o sr. Depaul que uma mulher atacada de variola dera á luz no mez seguinte uma criança morta coberta de pustulas variolicas. Em Lisboa foi visto um caso identico. O sr. Blaut, observou um caso em que a mãe, ficando illesa, servira de vehiculo ao virus variolico, pois que o feto nascêra morto e coberto de bexigas; e o sr. Villares viu exem-