

dicamos aquelles medicos que desejarem empregar este medicamento brasileiro, a pharmacia dos Srs. Silva Araujo & C.— Rua 1º de Março n. 5—, os quaes preparam-n'o em grande escala, pelo processo do professor Freire.

OBSTETRICIA

A PROPOSITO DE NUBENTES CONSANGUINEOS

Pelo Dr. A. RICALDI DA ROCHA CASTRO

No dia 8 de Fevereiro do corrente anno, ás 3 horas da madrugada, na villa de Porto Seguro, onde encetei a minha pequena clinica, fui chamado pelo Sr. F. para ver sua mulher que, havia 5 dias, soffria dores de parto.

D. F. é branca, tem 19 annos de idade, de pequena estatura, temperamento sanguineo, primipara; o volume do ventre era extraordinario, e dizia-me a parteira que julgava serem dous fetos; haviam dous volumes, ou saliencias na direcção longitudinal do ventre, como que separadas por uma depressão.

Procedi ao exame obstetrico, e pela palpação e auscultação não me pareceu haver mais de um feto; a criança estava viva mas os batimentos cardiacos eram quasi imperceptiveis, as contracções uterinas eram fracas e pouco frequentes. Foi-me custoso encontrar os ruidos do coração fetal; embalde percorria as linhas de auscultação das primeiras posições; fui encontral-os em uma linha quasi transversal correspondente ao umbigo, tendo o maximo de intensidade mais ou menos na linha media; e entretanto havia um volume depressivel para o lado da fossa iliaca direita, approximando-se da symphise do pubis. Pelo toque reconheci o collo uterino em começo de dilatação.

Compreendi que o caso era difficiloso e resolvi proceder com toda prudência; medico novel, sem um collega que me auxi-

liasse e sem ter alli instrumentos de obstetricia resolvi esperar ; a parturiente estava bastante impressionada ; animei-a, e depois de alguns conselhos retirei-me cuidadoso. Pela manhã, alem da visita usual em torno da villa, tive um chamado que me deteve até ás tres horas e meia da tarde. Chegando á casa fui immediatamente procurado pelo marido, dizendo-me achar-se ella muito desanimada ; effectivamente segui com elle e nova e minuciosamente examinei a senhora : a criança era já morta, tinham cessado as contracções uterinas ; o collo estava completamente dilatado, roto o sacco das aguas e escoado todo o liquido amniotico ; percebia-se entretanto pelo toque uma parte do feto que tinha franqueado o estreito superior, e se achava na excavação, dando a sensação de um tumor molle, sem comtudo deixar passar a mão ; reconheci ser a cabeça, pelo coiro cabelludo ; não distingui fontanellas nem suturas.

Reconheci um facto de hydrocephalia e tratei da operação, afim de dar sahida a cabeça do feto sem a qual era de receiar a terminação fatal e proxima, tal era o desanimo, a prostração e abatimento em que estava a pobre moça.

Pratiquei a craneotomia, mesmo com um bistouri forte ; o que, embora com alguma difficuldade, consegui, pois que os parietaes nesse logar eram laminas osseas, quasi cartilaginosas. O liquido que então correu em um grosso jorro, trazendo afinal de envolta certa porção da substancia cerebral, foi bem um litro de agua, ou talvez mais.

Escoado o liquido, reduzi o mais possivel e esmaguei os ossos, e com grande cautela e difficuldade pude extrahir a cabeça, e com brandas tracções e manejos obstetricos consegui felizmente o parto sem lesão alguma das partes maternas.

Era preciso abreviar, e poupar as forças á doente ; dei o devido descanso e procedi em seguida á extracção da placenta que era de um volume enorme e simulava o volume de outro feto.

Com duas horas de trabalho deixei a parturiente inteiramente desembaraçada.

Sobreveio então febre puerperal e metrite; mas em tempo combati estes accidentes; houve parada de lochios por um a dous dias mas continuaram depois o seu curso. Um purgante de oleo de ricino, applicação de agua ingleza, fomentações de pomada mercurial belladonada, etc., fizeram a principal medicação; ficou-lhe uma incontinencia de ourinas, que tambem foi combatida, e depois de um mez estava completamente restabelecida.

Chamo, porém, a attenção para a etiologia, em que, a meu ver tem grande parte a consanguinidade dos conjuges: o marido é tio d'esta senhora. A Igreja, fôco das grandes verdades, não é de balde que reprova os casamentos entre consanguineos, e a sciencia medica, baseada na observação constante dos factos repelle-os; e nem se pode n'este caso appellar para a incapacidade physica dos paes, visto que ambos são moços, robustos e gozam de saúde vigorosa.

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

TRATAMENTO DIAPHORETICO DA ECLAMPSIA PUERPERAL POR MEIO DE BANHOS QUENTES. — Na memoria com este titulo, publicada pelo dr. Carl Breue nos *Arch. f. Gynae*, propõe-se applicar á eclampsia puerperal o methodo diaphoretico de Liebermeister usualmente empregado na doença de Bright, e conteem-se as observações de onze doentes tratados por esse modo. Embora todos os casos, á excepção talvez de tres, fossem de fórmulas bastante graves, apenas morreu uma doente e essa mesmo muito provavelmente em seguida a infecção septica.

O methodo consiste n'isto: a doente é posta n'um banho aquecido a cerca de 38° C., cuja temperatura se eleva então sucessivamente. Depois d'isto é envolvida em lençoes de linho e cobertores de lã e assim se consegue uma abundante diaphoresese. Já depois dos primeiros banhos e envolvimentos, que quando