

Sobreveio então febre puerperal e metrite; mas em tempo combati estes accidentes; houve parada de lochios por um a dous dias mas continuaram depois o seu curso. Um purgante de oleo de ricino, applicação de agua ingleza, fomentações de pomada mercurial belladonada, etc., fizeram a principal medicação; ficou-lhe uma incontinencia de ourinas, que tambem foi combatida, e depois de um mez estava completamente restabelecida.

Chamo, porém, a attenção para a etiologia, em que, a meu ver tem grande parte a consanguinidade dos conjuges: o marido é tio d'esta senhora. A Igreja, fôco das grandes verdades, não é de balde que reprova os casamentos entre consanguineos, e a sciencia medica, baseada na observação constante dos factos repelle-os; e nem se pode n'este caso appellar para a incapacidade physica dos paes, visto que ambos são moços, robustos e gozam de saúde vigorosa.

---

## REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

---

TRATAMENTO DIAPHORETICO DA ECLAMPSIA PUERPERAL POR MEIO DE BANHOS QUENTES. — Na memoria com este titulo, publicada pelo dr. Carl Breue nos *Arch. f. Gynae*, propõe-se applicar á eclampsia puerperal o methodo diaphoretico de Liebermeister usualmente empregado na doença de Bright, e conteem-se as observações de onze doentes tratados por esse modo. Embora todos os casos, á excepção talvez de tres, fossem de fórmulas bastante graves, apenas morreu uma doente e essa mesmo muito provavelmente em seguida a infecção septica.

O methodo consiste n'isto: a doente é posta n'um banho aquecido a cerca de 38° C., cuja temperatura se eleva então sucessivamente. Depois d'isto é envolvida em lençoes de linho e cobertores de lã e assim se consegue uma abundante diaphoresese. Já depois dos primeiros banhos e envoltimentos, que quando

precisos, se podem repetir todos os dias, a anciedade respiratoria reduz-se e os edemas diminuem. Em nenhum caso se observaram accidentes imprevistos—quer hemorragias importantes nas recém-paridas, quer partos prematuros nas grávidas. Por isso os banhos quentes também se recommendam como meio prophylactico nas grávidas, quando a existencia de edemas e de albuminuria fazem receiar o apparecimento de ataques eclámpticos.

De resto subsistem os preceitos therapeuticos até aqui observados: narcose com o chloroformio ou clysteres de hydrato de chloral e acceleração do parto, tanto quanto fór possível de um modo moderado.

(*Deutsche med. Zeitung e Medicina Contemporanea*).

ALTERAÇÕES DO SYSTEMA NERVOSO CENTRAL, ESPECIALMENTE DOS CORDÕES POSTERIORES DA MEDULLA, NO ERGOTISMO.—No XI vol. dos *Arch. f. Psych.* Siemens descreveu 11 casos da epidemia de ergotismo que reinou em 1879 no circulo de Frankenberg (Cassel) e muitas victimas produziu. O Dr. Franz Tuczek apresenta agora 17 novas observações da mesma epidemia. Em todos os casos appareceram em primeira plana symptomas do lado do systema nervoso central; não se notaram phenomenos importantes de gangrena. Todos os doentes mostraram perturbações do espirito (na maior parte dos casos demencia aguda, mas também mania e melancolia), demais ataques epilepticos e consideravel cachexia; *todos apresentaram no fim symptomas de doença dos cordões posteriores*; o phenomeno do joelho faltou sempre; em differentes casos havia além d'isso formigueiros, sensação de cintura, dores fulgurantes, sensibilidade á dor diminuida, ataxia, vacillação no andar com os olhos fechados. A fórma da doença—abstraindo da sensibilidade morbida muitas vezes muito augmentada e da ausencia de idéas de grandeza, era extraordinariamente semelhante a

do tabes combinado com a paralysis progressiva. Só muito raras vezes estes symptommas se desenvolveram logo depois dos primeiros phenomenos de intoxicação aguda; na maior parte dos casos appareceram depois de mezes, quando já se tinha desenvolvido a cachexia geral. O desenlace foi sempre grave. Dos 28 recebidos no estabelecimento, morreram 4, recidivaram 8, não offereceram nenhuma perspectiva de restabelecimento 4. Os restantes 12 ficaram com algumas perturbações da intelligencia, e em todos, á excepção d'um, se suspeitou da persistencia da affecção medullar pela falta do phenomeno do joelho, que continuou.

Nos 4 casos terminados pela morte pôde T. demonstrar anatomicamente a doença dos cordões posteriores, que em nada se distingue da sclerose typica dos cordões posteriores (tabes), tanto pelo seu desenvolvimento com pela atrophia incompleta d'elle dependente. O formigueiro, que deu o nome á doença (doença de formigueiro, Kriebelkrankheit), só agora se mostra em clara luz. No cerebro e nas restantes partes do systema nervoso central achou-se hyperemia em grão maior ou menor e degeneração gorda das paredes dos vasos.

Casos semelhantes teem sido observados em seguida á pella-gra e á lepra, na intoxicação pelo absyntho, no puerperio, na escariatina, e na diphtheria.

As experiencias que o auctor empreheendeu com o fim de produzir a affecção medullar em animaes, dando-lhes a comer cravagem de centeio, não tiveram nenhum resultado. Os coelhos supportam até 25 grammas por dia sem qualquer damno; os cães e gatos morreram depois de alguns mezes e mostraram no fim desarranjos de coordenação. porém o phenomeno do joelho conservou-se e o exame da medulla foi negativo.)

(*Deutsche med. Zeit e Medicina Contemporanea*).

UM CASO OBSTETRICO INTERESSANTE.—O Dr. Cory publica no ultimo numero da *Lancet* um caso obstetrico muito interessante. Depois de dores prolongadas por dois dias n'uma mulher multipara, o auctor foi chamado. A gravidez era dupla e os dois fetos tinham ambos já começado a sair; o n. 1 tinha a cabeça completamente expulsa, a face voltada para o pubis materno e o pescoco entalado entre a arcada e o feto n. 2; d'este já tinham saído os membros e o tronco e a cabeça estava fixa por um lado sobre a articulação sacro-iliaca direita pelo queixo e pelo occiput sobre o pubis da mãe. O Dr. Cory, com grande difficuldade, perfurou a cabeça do n. 2 e pôde extrahir o feto; o n. 1 seguiu facilmente.

TRATAMENTO DO CANCRO DO SEIO—No 12.º congresso da sociedade allemã de cirurgia, que teve logar em abril ultimo, Kuster insistiu na dupla necessidade de uma ablação total do seio nos casos de tumor maligno e da extirpação dos ganglios axillares. Estes podem não parecer engorgitados á palpação através dos tegumentos. Ora, sobre 117 casos d'amputação do seio completada pela toilette da cavidade axillar, que o auctor foi buscar a diversas origens, só duas vezes se encontraram sãos os ganglios axillares examinados ao microscopio. De 15 mulheres, em que não se fez a *amputação regionnaria*, isto é, a extirpação completa da glandula degenerada e dos ganglios axillares, 13 succumbiram a uma recidiva ao cabo de muito pouco tempo e as outras duas tiveram que soffrer segunda operação. —Os 117 casos de extirpação completa com toilette da cavidade da axilla forneceram uma proporção de mortalidade de 15%; esta estatistica abrange o periodo em que ainda não estava vulgarisado o penso antiseptico e em que portanto havia a contar com as devastações da infecção septica.

Pelo que respeita ás curas, Kuster annuncia 21,5 % de curas definitivas, contando como taes os casos em que tres annos

depois ainda não tinha havido recidiva; em 20,17 % dos casos operados com successo ainda não havia recidiva ao cabo de dois annos d'observação.

(*Medicina Contemporanea*).

TRANSPLANTAÇÃO DE FRAGMENTOS DE ESPONJA, APPLICADA AO TRATAMENTO DAS FERIDAS—No jornal de medicina d'Edimburgo (1.º nov. 1882) o professor Hamilton tinha descripto com o nome de *sponge-grafting* (enxerto de fragmentos de esponja) um novo modo de tratamento de certas feridas. Eis em que elle consiste: pedaços pequenos de esponja são embebidos d'uma mistura de acido azotico e acido chlorhydrico diluidos; são em seguida lavados com umá solução ammoniacal e conservados n'uma solução de acido phenico a 5%. Se se trata de alcançar a cicatrização de uma ferida anfractuosa, enchem-se as suas cavidades com esses pedaços de esponja e fixa-se por cima uma folha de gutta-percha e de *lint*. Ao cabo de algum tempo, os fragmentos de esponja acham-se apertados nas granulações, que se elevam até á superficie da ferida; são reabsorvidos pelo tempo adiante, emquanto que a excavação primitiva se enche de tecido cicatricial.

O Dr. Sanctuary modificou levemente este processo; uma esponja muito fina, submettida por muitas horas ao cosimento em acido chlorhydrico diluido, é em seguida posta n'uma solução alcalina de creozote durante meio dia. No momento em que vae servir a um penso, corta-se a esponja em laminas muito delgadas, com que se enche a excavação da ferida depois de a ter lavado com a solução alcalina creozotada. Em seguida cobre-se tudo com uma folha de gutta-percha sobre a qual se faz actuar uma pressão continua, afim de que as granulações que se formarem á superficie da ferida não empurrem diante de si os fragmentos de esponja. Estes, ao fim de tres ou quatro dias, já adherem intimamente á ferida. A cicatrização caminha com

rapidez, embora o penso exhale um leve cheiro de putrefacção.

Fergusson modificou o processo de Hamilton n'este sentido que, logo que as laminas de esponja estão agarradas na ferida em via de cicatrização, corta-as razas com a pelle. Os resultados da sua observação também são muito favoráveis a este novo modo de penso, que está principalmente indicado nos casos de feridas anfractuosas e torpidas.

(*Medicina Contemporanea*).

TRATAMENTO GALVANO-CAUSTICO DA HYPERTROPHIA DA PROSTATA.—O dr. Tansini publica na *Gaz. degli ospedali* um artigo sobre o methodo de Bottini que consiste em dividir com o thermocauterio o lóbo da prostata hypertrophiada que impede a saída da urina. Admira-se de que o methodo não seja mais vezes empregado, principalmente no estrangeiro, porque dá excellentes resultados e não provoca nenhum accidente.

A cauterisação pelo galvano cauterio, que divide a parte da prostata saliente para o lado da urethra, impede toda a hemorragia, ao mesmo tempo que a eschara produzida fecha a porta ás infecções.

O volume do instrumento não tem nada de exaggerado: a introdução não é muito difficil.

O instrumento primitivamente empregado por Bottini tinha uma desvantagem consideravel, que consistia na elevação da temperatura da totalidade do instrumento, o que podia produzir uma cauterisação leve com queda do epithelio de toda a superficie da urethra.

Hoje, o nosso instrumento é composto de um tubo duplo pelo qual passa continuamente uma corrente de agua fria. Localisa-se assim a cauterisação ao ponto em que a lamina de platina, levada ao rubro pela corrente, deve cortar o lobo prostatico.

O auctor teve sempre successos completos ou notaveis melhoras nos doentes que foram submettidos ao tratamento. A operação não deve ser praticada senão nos doentes em que debalde se tentaram os outros processos racionaes, que de ordinario se oppõem á doença.

*(Medicina Contemporanea).*

MIGRAÇÕES INSOLITAS DAS ASCARIDES LOMBRICOIDES. — As duas observações que vamos resumir são interessantes, porque mostram as ascarides sairem do intestino e introduzirem-se n'outras vias preparadas pelas alterações dos órgãos visinhos. — No 1.º caso, uma mulher de 26 annos, apresenta-se com ictericia, febre, peso no estomago, vivas dores no hypochondrio direito; figado sensivel á pressão e augmentando de volume. Dias depois, observam-se duas bossas fluctuantes á superficie do figado; diagnosticam-se abcessos d'este órgão. Morte 6 dias mais tarde. Na autopsia—figado hypertrophiado e com um grande numero de abcessos, cujo ponto de partida está n'uma inflamação das vias biliares. Os canaes biliares, muito dilatados e cheios de pus e de concreções friaveis; no canal chole-doco pôde-se introduzir o dedo; o canal cystico tambem dilatado mas obliterado na sua extremidade superior, de modo que a vesicula, cheia de muco, está reduzida ao volume d'uma avelã. N'esses dois canaes muitos calculos e uma ascaride de 15 centimetros de comprimento, cuja cabeça se alojára no canal cystico—No 2.º caso dores vivas no epigastro e febre intensa; ventre inchado, doloroso; atrozes gastralgias, apparecendo por accessos e seguidos de resfriamento e collapso passageiro. 11 dias depois violenta colica, que se repete passados 15 dias: dores intoleraveis, febre, diarrhéa, vomitos excessivos, tympanismo, dyspnéa; estes symptomas não diminuem e o doente morre duas semanas depois do começo d'este 2.º ataque. Na autopsia, além de outras lesões, encontraram-se na parede posterior do estomago e do doudeno 4 pequenos orificios, devidos á abertura de abcessos do pancreas no tubo digestivo.

Incisando o pancreas, vê-se uma fistula que, partindo do duodeno, vae ter á veia splênica ulcerada; n'esta fistula estava alojada uma ascaride do comprimento de 18 centímetros, cuja extremidade superior se introduzira no interior do vaso. O parasita tinha penetrado na veia durante a vida, visto que atraz, do lado do baço, se encontrava um thrombo fibrinoso, que não tinha o caracter das coagulações cadavericas.

(*Arch. gén. de méd.*).

DA TUBERCULOSE MILIAR AGUDA CONSECUTIVA Á REABSORPÇÃO RÁPIDA OU Á EVACUAÇÃO DE EXSUDADOS PLEURITICOS.—Litten publicou em fasciculos da collecção Volkmann, a proposito da tuberculose miliar aguda, tres observações em que a affecção se tinha desenvolvido immediatamente depois do desaparecimento de derrames pleuríticos abundantes. N'um 4.º caso, hoje publicado nos *Annaes da Caridade de Berlim*, e que com os outros encontramos nos *Arch. ger. de med.*, trata-se de uma mulher de 49 annos sem herança suspeita, mãe de muitos filhos sãos; um derrame pleurítico abundante, ameaçando asphyxia, é tratado pela punctura e extraem-se 4 litros de serosidade; allivio rapido e só na base do pulmão esquerdo persiste uma estreita zona de som macisso. Ao cabo de alguns dias manifestam-se symptomas geraes graves, dyspnéa, calefrio, febre de noite; o liquido não se reproduz; fervores sonoros em todo o peito e nos apices dos pulmões fervores crepitantes finos. Os symptomas aggravam-se e 15 dias depois da operação a doente morre. Na autopsia descobre-se a pleura esquerda contendo falsas membranas, sem liquidos. Os lóbos superiores dos pulmões encerram fôcos caseosos desenvolvidos á roda dos bronchios. O resto do parenchyma está semeado de granulações cinzentas, que se encontram na superficie das pleuras, no figado, nos rins, no baço, no musculo cardiaco, no peritoneu e no canal thoracico.

O auctor pensa que as relações estreitas, que ligam a suppressão dos derrames pleuraes com o apparecimento da

tuberculose miliar aguda, se podem explicar ou pela excitação que resulta da descompressão rapida do pulmão e que actuaria como em individuos predispostos o fazem outras irritações locais — arthrite, pleuresia, pericardite (Virchow), — ou pela reabsorção dos productos vulgares das serosas, que, parecendo inoffensivos, podem representar o papel do virus especifico. Seja como fór d'estas hypotheses, o ensinamento que resulta dos factos expostos é o perigo da evacuação brusca da totalidade do liquido pleuritico, já receiados por outras causas.

(*Med Contemporanea*).

## INDEX THERAPEUTICO

### NOTICIA SOBRE A PEPTONA DEFRESNE

Illm. Sr. Dr. Francisco Corrêa Diniz:

Tendo V. me enviado um pequeno vidro de Peptona de Defresne e um outro de vinho do mesmo preparado julguei conveniente submeter á acção d'estes medicamentos tres doentes de minha clinica, os quaes em poucos dias apresentaram melhoras sensiveis, naturalmente devidas á importante acção reconstituinte e analeptica d'estes preparados.

Empregámos a Peptona primeiramente em um caso inteiramente perdido de uma tuberculose pulmonar em 3º periodo e de fórma galopante. Com o emprego d'este producto pharmaceutico, não tivemos em vista curar o enfermo, mas sim melhorar o seu estado de abatimento concedendo-lhe alguns dias de vida.

A consumpção era violenta e o appetite nenhum, acompanhado de prostração geral do organismo que dava logar a uma serie de perturbações nervosas mais ou menos assustadoras. Com a applicação moderada da Peptona em caldos e leite, obtivemos em

poucos dias o reaparecimento do appetite e com este as forças vitais inteiramente gastas e que faziam desanimar o enfermo physica e moralmente.

O nosso doente levantou-se do leito de dores e procura prolongar a sua existencia com a continua applicação d'este preparado. Os dois outros casos são de uma doente que soffre de *anemia* e de uma outra de *chloro-anemia*, obtendo em ambos os casos magnificos resultados.

Considerando a anemia uma diminuição do liquido sanguineo com modificação propria de sua composição, devida a desordens da nutrição com perturbações morbidas consecutivas a outras affecções, julguei acertado aconselhar semelhante tonico nutritivo que, como esperavamos, produziu o desejado effeito, fazendo reaparecer o appetite em nossas enfermas, nutrindo-as convenientemente e progressivamente, desaparecendo toda a serie de incommodos nervosos, que geralmente são consequências do enfraquecimento geral do organismo.

Com a dóse de 3 a 4 colheres de Peptona e meio calix de vinho no jantar, podemos considerar os doentes em plena convalescença.

Aguardo melhores observações para firmar o meu juizo sobre tão importante preparado, que me parece um valioso coadjuvante nas convalescenças longas resultantes de enfermidades graves agudas e chronicas.

DR. EDUARDO DE ABREU.

Rio de Janeiro, 10 de 1882

---

## NOTICIARIO

---

BERIBERI NA ESQUADRILHA DE EVOLUÇÕES—Segundo noticiou uma das folhas da tarde, desembarcaram da corveta *Guana-  
bara* 57 praças doentes da esquadilha de evoluções, sendo 82

atacadas de beriberi, das quaes 55 pertencem a guarnição da corveta *Nitheroy*, e 2 á do *Primeiro de Março*.

D'estes doentes iam ser remettidos para Itaparica os 28 beribericos, ficando os outros no hospital de marinha em observação.

Este facto occorrido a bordo de navios em movimento, e outros muitos analogos de que temos noticia, parecem não deixar duvidas sobre ser o beriberi uma molestia de origem infectuosa, devida a causas locaes de insalubridade.

A construcção dos nossos navios de guerra, ou pelo menos a de alguns d'elles não se recommenda pela observancia dos principios de boa hygiene; e lembra-nos que a proposito da *Vital de Oliveira*, que teve em sua viagem de circumnavegação numerosos beribericos no mar das Indias, e na travessia do Japão para S. Francisco da California, o Sr. Dr. Galdino Cicero de Magalhães accusou severamente os numerosos defeitos de construcção que tornam insalubre aquelle navio. Poucos têm sido infelizmente os nossos collegas da marinha que se têm occupado com tanto empenho d'estas questões d'hygiene naval, o que é muito para lamentar, porque trata-se da saúde e vida de homens que dedicam uma e outra ao serviço do seu paiz. E ainda que trabalhos como os d'aquelle distincto collega não encontrem echo nas altas regiões governativas, ficam sempre com o seu valor scientifico, e como protestos da profissão, cujo silencio importaria a cumplicidade nas consequencias desastrosas das graves faltas d'hygiene de que são accusados os nossos vasos de guerra, quer na construcção e accomodações internas, quer no passadio dos tripolantes.

Pelo que respeita ao expediente adoptado para com aquelles doentes de beriberi, parece que sendo a molestia infectuosa não é o melhor meio de tratamento ajuntal-os em uma enfermaria de um hospital qualquer, onde a inevitavel accumulção lhes pode aggravar o mal; transportal-os para o sul do imperio e

disseminal-os seria muito mais racional, e melhor garantia para o seu restabelecimento.

Sabemos, a ultima hora, que a *Nictheroy* trouxe ainda grande numero de beribericos, subindo já a perto de 70 os atacados d'esta molestia n'aquelle navio. No proximo numero daremos noticia mais circumstanciada do facto com os esclarecimentos que podermos obter.

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA.—No dia 6 do mez findo terminou a inscripção para os concursos ás cadeiras de anatomia e physiologia pathologica, 2ª de clinica medica e 2ª de clinica cirurgica.

Inscreveram-se á primeira os Srs. Drs. José Carneiro de Campos e Antonio Pacheco Mendes, á 2ª o Sr. Dr. José Luiz de Almeida Couto e á 3ª o Sr. Dr. Manuel Victorino Pereira.

No dia 15 terminaram as provas do concurso á 2ª cadeira de clinica medica, sendo approvado por unanimidade de votos o candidato Sr. Dr. José Luiz de Almeida Couto.

No dia 22 terminou o concurso á 2ª cadeira de clinica cirurgica, sendo unanimemente approvado o candidato Sr. Dr. Manuel Victorino Pereira, e resolvendo além d'isto a congregação, por unanimidade, que se consignasse na acta um voto de louvor ao mesmo candidato pelas provas exhibidas no concurso.

MINISTERIO DO IMPERIO.—Por este ministerio foi expedido, na data abaixo designada, o seguinte aviso, que interessa aos concursos de adjuntos que vão realisar-se brevemente em nossa Faculdade.

—Ministerio dos negocios do imperio, 2ª directoria.—Rio de Janeiro, em 17 de abril de 1883.

Declaro a V. S., para devidos effeitos, que para proceder-se a qualquer dos actos dos concursos aos logares vagos de adjuntos a varias cadeiras d'essa Faculdade, basta que