

precisos, se podem repetir todos os dias, a anciedade respiratoria reduz-se e os edemas diminuem. Em nenhum caso se observaram accidentes imprevistos—quer hemorragias importantes nas recém-paridas, quer partos prematuros nas grávidas. Por isso os banhos quentes também se recommendam como meio prophylactico nas grávidas, quando a existencia de edemas e de albuminuria fazem receiar o apparecimento de ataques eclámpticos.

De resto subsistem os preceitos therapeuticos até aqui observados: narcose com o chloroformio ou clysteres de hydrato de chloral e acceleração do parto, tanto quanto fór possível de um modo moderado.

(*Deutsche med. Zeitung e Medicina Contemporanea*).

ALTERAÇÕES DO SYSTEMA NERVOSO CENTRAL, ESPECIALMENTE DOS CORDÕES POSTERIORES DA MEDULLA, NO ERGOTISMO.—No XI vol. dos *Arch. f. Psych.* Siemens descreveu 11 casos da epidemia de ergotismo que reinou em 1879 no circulo de Frankenberg (Cassel) e muitas victimas produziu. O Dr. Franz Tuczek apresenta agora 17 novas observações da mesma epidemia. Em todos os casos appareceram em primeira plana symptomas do lado do systema nervoso central; não se notaram phenomenos importantes de gangrena. Todos os doentes mostraram perturbações do espirito (na maior parte dos casos demencia aguda, mas também mania e melancolia), demais ataques epilepticos e consideravel cachexia; *todos apresentaram no fim symptomas de doença dos cordões posteriores*; o phenomeno do joelho faltou sempre; em differentes casos havia além d'isso formigueiros, sensação de cintura, dores fulgurantes, sensibilidade á dor diminuida, ataxia, vacillação no andar com os olhos fechados. A fórma da doença—abstraindo da sensibilidade morbida muitas vezes muito augmentada e da ausencia de idéas de grandeza, era extraordinariamente semelhante a

do tabes combinado com a paralysis progressiva. Só muito raras vezes estes symptomatos se desenvolveram logo depois dos primeiros phenomenos de intoxicação aguda; na maior parte dos casos appareceram depois de mezes, quando já se tinha desenvolvido a cachexia geral. O desenlace foi sempre grave. Dos 28 recebidos no estabelecimento, morreram 4, recidivaram 8, não offereceram nenhuma perspectiva de restabelecimento 4. Os restantes 12 ficaram com algumas perturbações da intelligencia, e em todos, á excepção d'um, se suspeitou da persistencia da affecção medullar pela falta do phenomeno do joelho, que continuou.

Nos 4 casos terminados pela morte pôde T. demonstrar anatomicamente a doença dos cordões posteriores, que em nada se distingue da sclerose typica dos cordões posteriores (tabes), tanto pelo seu desenvolvimento com pela atrophia incompleta d'elle dependente. O formigueiro, que deu o nome á doença (doença de formigueiro, Kriebelkrankheit), só agora se mostra em clara luz. No cerebro e nas restantes partes do systema nervoso central achou-se hyperemia em grão maior ou menor e degeneração gorda das paredes dos vasos.

Casos semelhantes teem sido observados em seguida á pella-gra e á lepra, na intoxicação pelo absyntho, no puerperio, na escariatina, e na diphtheria.

As experiencias que o auctor emprendeu com o fim de produzir a affecção medullar em animaes, dando-lhes a comer cravagem de centeio, não tiveram nenhum resultado. Os coelhos supportam até 25 grammas por dia sem qualquer damno; os cães e gatos morreram depois de alguns mezes e mostraram no fim desarranjos de coordenação. porém o phenomeno do joelho conservou-se e o exame da medulla foi negativo.)

(*Deutsche med. Zeit e Medicina Contemporanea*).