

UM CASO OBSTETRICO INTERESSANTE.—O Dr. Cory publica no ultimo numero da *Lancet* um caso obstetrico muito interessante. Depois de dores prolongadas por dois dias n'uma mulher multipara, o auctor foi chamado. A gravidez era dupla e os dois fetos tinham ambos já começado a sair; o n. 1 tinha a cabeça completamente expulsa, a face voltada para o pubis materno e o pescoco entalado entre a arcada e o feto n. 2; d'este já tinham saído os membros e o tronco e a cabeça estava fixa por um lado sobre a articulação sacro-iliaca direita pelo queixo e pelo occiput sobre o pubis da mãe. O Dr. Cory, com grande difficuldade, perfurou a cabeça do n. 2 e pôde extrahir o feto; o n. 1 seguiu facilmente.

TRATAMENTO DO CANCRO DO SEIO—No 12.º congresso da sociedade allemã de cirurgia, que teve logar em abril ultimo, Kuster insistiu na duplá necessidade de uma ablação total do seio nos casos de tumor maligno e da extirpação dos ganglios axillares. Estes podem não parecer engorgitados á palpação através dos tegumentos. Ora, sobre 117 casos d'amputação do seio completada pela toilette da cavidade axillar, que o auctor foi buscar a diversas origens, só duas vezes se encontraram sãos os ganglios axillares examinados ao microscopio. De 15 mulheres, em que não se fez a *amputação regionnaria*, isto è, a extirpação completa da glandula degenerada e dos ganglios axillares, 13 succumbiram a uma recidiva ao cabo de muito pouco tempo e as outras duas tiveram que soffrer segunda operação. —Os 117 casos de extirpação completa com toilette da cavidade da axilla forneceram uma proporção de mortalidade de 15%; esta estatistica abrange o periodo em que ainda não estava vulgarisado o penso antiseptico e em que portanto havia a contar com as devastações da infecção septica.

Pelo que respeita ás curas, Kuster annuncia 21,5 % de curas definitivas, contando como taes os casos em que tres annos