

Incisando o pancreas, vê-se uma fistula que, partindo do duodeno, vae ter á veia splênica ulcerada; n'esta fistula estava alojada uma ascaride do comprimento de 18 centímetros, cuja extremidade superior se introduzira no interior do vaso. O parasita tinha penetrado na veia durante a vida, visto que atraz, do lado do baço, se encontrava um thrombo fibrinoso, que não tinha o caracter das coagulações cadavericas.

(*Arch. gén. de méd.*).

DA TUBERCULOSE MILIAR AGUDA CONSECUTIVA Á REABSORPÇÃO RÁPIDA OU Á EVACUAÇÃO DE EXSUDADOS PLEURITICOS.—Litten publicou em fasciculos da collecção Volkmann, a proposito da tuberculose miliar aguda, tres observações em que a affecção se tinha desenvolvido immediatamente depois do desaparecimento de derrames pleuríticos abundantes. N'um 4.º caso, hoje publicado nos *Annaes da Caridade de Berlim*, e que com os outros encontramos nos *Arch. ger. de med.*, trata-se de uma mulher de 49 annos sem herança suspeita, mãe de muitos filhos sãos; um derrame pleurítico abundante, ameaçando asphyxia, é tratado pela punctura e extraem-se 4 litros de serosidade; allivio rapido e só na base do pulmão esquerdo persiste uma estreita zona de som macisso. Ao cabo de alguns dias manifestam-se symptomas geraes graves, dyspnéa, calefrio, febre de noite; o liquido não se reproduz; fervores sonoros em todo o peito e nos apices dos pulmões fervores crepitantes finos. Os symptomas aggravam-se e 15 dias depois da operação a doente morre. Na autopsia descobre-se a pleura esquerda contendo falsas membranas, sem liquidos. Os lobos superiores dos pulmões encerram fôcos caseosos desenvolvidos á roda dos bronchios. O resto do parenchyma está semeado de granulações cinzentas, que se encontram na superficie das pleuras, no figado, nos rins, no baço, no musculo cardiaco, no peritoneu e no canal thoracico.

O auctor pensa que as relações estreitas, que ligam a suppressão dos derrames pleuraes com o apparecimento da

tuberculose miliar aguda, se podem explicar ou pela excitação que resulta da descompressão rapida do pulmão e que actuaria como em individuos predispostos o fazem outras irritações locais — arthrite, pleuresia, pericardite (Virchow), — ou pela reabsorção dos productos vulgares das serosas, que, parecendo inoffensivos, podem representar o papel do virus especifico. Seja como fór d'estas hypotheses, o ensinamento que resulta dos factos expostos é o perigo da evacuação brusca da totalidade do liquido pleuritico, já receiados por outras causas.

(*Med Contemporanea*).

INDEX THERAPEUTICO

NOTICIA SOBRE A PEPTONA DEFRESNE

Illm. Sr. Dr. Francisco Corrêa Diniz:

Tendo V. me enviado um pequeno vidro de Peptona de Defresne e um outro de vinho do mesmo preparado julguei conveniente submeter á acção d'estes medicamentos tres doentes de minha clinica, os quaes em poucos dias apresentaram melhoras sensiveis, naturalmente devidas á importante acção reconstituinte e analeptica d'estes preparados.

Empregámos a Peptona primeiramente em um caso inteiramente perdido de uma tuberculose pulmonar em 3º periodo e de fórma galopante. Com o emprego d'este producto pharmaceutico, não tivemos em vista curar o enfermo, mas sim melhorar o seu estado de abatimento concedendo-lhe alguns dias de vida.

A consumpção era violenta e o appetite nenhum, acompanhado de prostração geral do organismo que dava logar a uma serie de perturbações nervosas mais ou menos assustadoras. Com a applicação moderada da Peptona em caldos e leite, obtivemos em