

Bull. de ther., aconselha a administração do ether pela via estomacal, servindo-se da formula seguinte :

Ether sulfurico.....	} ana XXX gottas
Laudano de Rousseau	
Poção gommosa	150 grammas

M. s. a.—Para tomar em 24 horas.

Todavia o auctor não apresenta factos tão incontestaveis que façam preferir o seu methodo ao do sr. Ducastel, cuja inocuidade e cujos effeitos favoraveis são comprovados pelas suas observações e pelas de outros médicos que o adoptaram. (*A Medicina Contemporanea.*)

ESTADO CATALEPTICO DOS MUSCULOS APOS A SECÇÃO DO BOLBO.—Brown Sequard diz ter notado que, após a secção do bôlbo rachidiano em um animal, os seus membros collocados em uma posição qualquer conservavam esta attitude durante um certo tempo.

Para o illustre professor este estado particular dos musculos nenhuma identidade tem com a rigidez cadaverica que, uma vez vencida, não se reproduz instantaneamente e é inteiramente comparavel aos phenomenos musculares que se apresentam após a morte por lesão do cerebello; elle tem sua origem nos musculos e isso por duas razões, sendo a *primeira* a permanencia da catalepsia, pelo menos por espaço de duas horas após a morte, quando sabe-se que, no fim d'este tempo, já o systema nervoso tem perdido toda a sua acção e a *segunda* a ausencia de modificação n'este phenomeno, quando destruída, até completamente a medulla do animal.

D'esta experiencia physiologica se pôde tirar analogias para certas contracções musculares observadas em cadaveres de individuos fallecidos de cholera ou de febre amarella.

A interpretação d'estes factos, emfim, permite supor-se que os tecidos contracteis podem, por si somente, ter um poder de obrar mais ou menos semelliante ao do systema nervoso.

UM REMEDIO PARA O CANCRO. — O Dr. W. A. Collins refere

ter empregado com grande vantagem o canteio finamente pulverisado contra todas as ulcerações cancerosas.

Para chegar a esse resultado elle faz applicar o pó de canteio, trez vezes ao dia, sobre a superficie ulcerada, cobrindo-a depois com um pedaço de mussellina imbebida em uma solução de acido phenico.

O autor termina confessando ter obtido resultados surprehendedentes com tal medicação. (*The Canada Lancet*).

CAUTERISAÇÃO DO CLITORIS NA HYSTERIA.—O professor Frie-dreich, pouco tempo antes de fallecer, escrevêra sobre este assumpto um trabalho que mais tarde foi publicado, e no qual elle refere ter feito em grande numero de casos de affecções hystericas intensas e pertinazes a cauterisação do clitoris, por meio do nitrato de prata, com o melhor êxito possível.

A cauterisação, diz o autor, deve ser profunda, pois que a superficial concorre antes para o agravamento da molestia.

A dôr é á principio intensa; e enquanto ella persiste a paciente deve conservar-se em seu leito.

Entre os casos que elle cita como rapidamente curados por este methodo figuram—um de paraplegia, que datava de um anno e meio; aphonia hysterica, datando de dous annos; glos-soplegia, datando de 4 mezes; espasmo tonico do espinhal accessorio, datando de sete mezes; além de muitos outros de convulsões hystericas geraes e intensas. (*Virchow's Archiv*).
União Medica

A ATREMIA.—Um medico de New-York, o dr. Neftel, publica nos *Virch. Arch.* observações suas sobre um novo estado morbido que recebeu aquelle nome.

A atremia é como que uma fôrma particular da loucura hypochondriaca. O symptoma principal da doença é a incapacidade de caminhar, sem que exista qualquer motivo do lado dos orgãos do movimento, sem que haja qualquer paralysisa motora. E' provavel que este symptoma se deva interpretar como um phenomeno de catalepsia, porque em observações