

tros e 2 decimas; no mez do anno passado 757 millimetros e 8 decimas.

O pluviometro marcou 335 millimetros e 4 decimas de agua de chuva, equivalentes a 13 litros, 416; no mez do anno passado 321 millimetros e 6 decimas, equivalentes a 12 litros, 864, differença para mais 13 millimetros e 8 decimas, equivalentes a 0 litro, 552.

Os ventos foram dos rumos de S., E e ESE., alguns dias SO., ENE. e N.

Houve 22 dias de chuva; no mez do anno passado 17 dias.

A tempestade que rebentou na madrugada do dia 28 de Maio cessou no dia 2 ao meio-dia.

Mez de Julho.—A temperatura media do mez foi 23,°75; n. mesmo mez do anno passado 24,°52. A temperatura ao sol foi, na media, 30,°25; no mez do anno passado 28,°75. A temperatura maxima 25,°50; no mez do anno passado 27°. A minima 22°; no mez do anno passado 22°,50. A media maxima dos dias 24°,42; no mez do anno passado 24°,89. A media minima das noites 22,°75; no mez do anno passado 23° 59. A pressão barometrica media calculada a zero, 758 millimetros e 2 decimas; no mez do anno passado 759 millimetros. O pluviometro marcou 291 millimetros de agua de chuva, equivalentes a 11 litros, 640; no mez do anno passado marcou 381 millimetros e 8 decimas, equivalentes a 15 litros, 272, differença para menos, 90 millims, e 8 decimas, equivalentes a 3 litros 632. Os ventos foram dos rumos de E; S; e SE: alguns dias OSO; NNO, e SO. Houve 22 dias de chuva; no mez do anno passado 16 dias. Foi sensivel o calor dos dois ultimos dias, 30 e 31.

Bahia, 1° de Agosto de 1883.—Dr. *Rosendo A. P. Guimarães*.

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

SOBRE O CRESCIMENTO E O PESO DO CORPO DOS MENINOS QUE
MAMAM—O Dr. Emil Pfeiffer em Wiesbaden, (Jahrb. f. Khk.

de N. F.) partindo da mui recta supposição, que é um erro tirar da observação de Fleischmann, a lei, que um menino que mama pesa no fim do quinto mez 550 g. mais do que o duplo de seu peso quando nasceu, e que no fim do primeiro anno elle pesa 900 grammas menos que o triplo do peso do nascimento, nos communica a media de 9 tabellas de crescimento de meninos que ainda mamavam, e que tinham pesos differentes ao nascer. D'ahi se vê que o accrescimento no segundo, sexto e nono mez é maior ainda do que até agora se julgava. Se construir-se com os números obtidos uma curva para o peso absoluto, veremos que esta curva concorda quasi exactamente com a de Bouchaud, isto é, que no fim do primeiro mez até o fim do decimo ella mostra um arco todo achatado, convexo para cima, se approximando muito da linha recta.

Nos nove casos do author chegou o augmento medio:

no 1º mez	a	375 g.
» 2º »	»	886 »
» 3º »	»	754 »
» 4º »	»	743 »
» 5º »	»	598 »
» 6º »	»	602 »
» 7º »	»	477 »
» 8º »	»	591 »
» 9º »	»	654 »
» 10 »	»	576 »
» 11 »	»	315 »
» 12 »	»	217 (?)

(*Kormann. Schmidt's Jahrbuch.*)

INJEÇÕES INTRA-VENOSAS COM SOLUÇÕES SALINAS—Um caso em que a vida foi inquestionavelmente continuada por effeito da injeção intra-venosa de uma solução salina veio ha pouco referido pelo dr. Szuman de Thorn na *Berl. Klin. Wochens.*, n.º 21. Um rapaz de 15 annos soffreu por accidente de machina violentas lesões—fractura do colo do humero direito, com ferida da articulação do hombro, fractura complicada da