

ganglionares. Elle explica isto pela atrophia da continuação dos cordões lateraes das pyramides que presume-se estarem na ponta anterior. (Möbius, Schmidt's Jahrbucher).

DILATAÇÃO DIGITAL DO PYLORO CONTRAHIDO.—Um novo methodo se junta á breve lista dos recursos da cirurgia do estomago, cujas doenças organicas teem sido, até aos ultimos annos, inteiramente abandonadas ás mãos dos medicos. O prof. Loreta de Bolonha propoz que se substituísse a dilatação forçada do orificio pylorico, em casos de simples aperto, á operação da resecção do pyloro. No *Journ. de méd.* vem publicada a observação de dous casos seguidos de bom resultado, pelo menos até á data do jornal; ambos os doentes foram operados por Loreta. Em poucas palavras, fez-se uma incisão longitudinal da parede abdominal á direita da linha branca; o estomago foi apanhado, puchado para fóra, e incisado proximo do pyloro, de modo a permittir que o dedo do cirurgião penetrasse no orificio, que por este modo foi forçadamente dilatado. Seria de muito interesse conhecer o resultado final dos casos publicados; é de receiar que a cura seja de curta duração olhando á natureza do tecido cicatricial. (*The Lancet.*)

RELAÇÃO ENTRE AS EPOCAS DA OVULAÇÃO, DA COHABITAÇÃO E DA CONCEPÇÃO.—Pelo Prof. Dr. P. L. Panum. (Nord. med. ark. XIV. 4. N.º 29.)—Mui raros são os casos nos quaes se pode determinar com segurança, alem da epoca da queda do ovulo ainda a da cohabitação fecundante, ou precisar quanto tempo a semen pode guardar-se nos orgãos genitales da mulher antes de tornar-se capaz de produzir a fecundação de um ovulo que se destaque.

Um d'estes casos nos communica o Dr. Panum.

No dia 11 de Julho de 1882 recebeu P. do Dr. Jacoby um pequeno fêto cujo amnion estava aberto; o chorion estava afastado por cuidadosa preparação. O fêto estava inteiramente fresco, mas pelo abalo durante o transporte, a cabeça com o pescoço se tinha separado dô corpo. O exame, com um fraco