

principia um estado durante o qual elle tem que viver á custa do proprio organismo: quanto mais insufficiente em qualidade ou quantidade a alimentação, tanto maior a desaggregação de albumina, (continua diminuição do peso, augmentada eliminação dos productos do desdobramento da albumina). Este gasto da albumina affecta em seguida a albumina em circulação no plasma do sangue, e d'este modo, e peia respiração que começa com energia depois do nascimento, affecta os globulos vermelhos do sangue.

Portanto, quanto mais duradouros e intensos estes processos, em mais alto gráo e mais forte será a destruição dos globulos vermelhas do sangue, coincidindo provavelmente com uma abastada producção de novos globulos. Como esta excessiva destruição dos globulos vermelhos do sangue, é em todo cazo, dentro dos limites de sua vida physiologica, como de outro lado, a materia corante da bilis representa um dos productos finaes essencialmente physiologicos da substancia córante do sangue; como além d'isso, pelo começo da funcção do intestino como órgão digestivo, a secreção da bilis sem duvida augmenta em gráo notavel, começa em consequencia das circumstancias referidas acima, um augmento de secreção de uma bilis muito rica em pigmento, augmento correspondente ao gráo mais ou menos perfeito de alimentação, e em consequencia d'isto, e talvez favorecida por certas circumstancias anatomicas dos canaes excretores, seguir-se-ha a passagem da bilis para o sangue, com a cor ictérica da pelle.

Que se considere esta circumstancia como physiologica ou pathologica, opiniões que pódem ser ambas justificadas, é certo que um desenvolvimento intenso e uma persistencia longa da ictericia deve pôr-nos de sobreaviso ás profundas anomalias da nutrição ou outras molestias que ao mesmo tempo affectem a creança. (Kormann-Schmidt's Jahrbuch, Abril, 1883.)

OPERAÇÃO DE PORRO.—O Sr. Ferdinando Franzolini, de Udine, praticou recentemente, segundo se vê na *Gazz. degli*

*ospitali*, a operação de Porro salvando-se a mãe e o filho. A doente, de 34 annos, era casada havia quatro e tinha tido tres abortamentos. Era muito deformada pelo rachitismo e a cavidade da bacia estava tão estreitada pela projecção do promontorio sacro que todas as contracções do trabalho eram inefficazes; as dores duravam havia cincoenta horas e desde vinte e seis se tinham rompido as membranas. O orificio estava alto, porém sufficientemente dilatado para admittir a extremidade de tres dedos. Apresentação de cabeça; o coração fetal batia muito perceptivelmente. Em satisfação aos instantes pedidos dos paes, o Dr. Franzolini determinou-se á extirpação do utero gravido e seus appendices como trazendo as maiores probabilidades de sobrevivencia para a mãe e para o filho e o unico meio de evitar novos perigos de vida por uma outra prenhez. Depois da administração do choloroformio, foi o utero gravido trazido para fóra do abdomen por uma abertura estendendo-se uma pollegada e meia acima do pubis até duas pollegadas abaixo do umbigo. Depois da extirpação do utero, o coto foi fixado no angulo inferior da incisão. A ferida, pensada com estopa purificada, embebida d'uma dissolução a 10 % de acido phenico, cicatrizou em grande parte por primeira intenção. A temperatura só excedeu 37°,7 no terceiro dia e então muito levemente. A partir do terceiro dia, a creança tomou o seio e continuou a desenvolver-se sem receber qualquer outro alimento. O pedunculo separou-se ao quinto dia. No decimo sexto a doente deixou a cama e o Dr. Franzolini teve a satisfação de acompanhar os progressos não interrompidos da mãe e do filho. *A Medicina Contemporanea.*

INJECCÕES HYPODERMICAS DE SAES MERCURIAES.—Galezowski, na sua ultima obra sobre o *Diagnostic e tratamento das affecções oculares*, diz ter desde 80 praticado com efficacia as injecções de 4 ou 5 milligr. de albuminato de mercurio; porém que ellas teem o inconveniente de produzir nodosidades dolorosas no tecido cellular e por outro lado as soluções difficilmente