

que lançou mão esta Faculdade depois de mil outras tentativas infructíferas.

Não tardará talvez que ella lance o grito de desespero, dos que preferem a morte á vida inglória e mesquinha a que querem condemná-la.

Senhores do governo, fechai a Faculdade de Medicina da Bahia, se não quereis dar-lhe os meios de viver !

CIRURGIA

UM CASO DE CURA DE TUMORES HEMORRHOIDAES INTERNOS PELO PERCHLORURETO DE FERRO

Pelo Dr. JULIO DA GAMA

E' sob o ponto de vista do tratamento que supponho curiosa a observação de um caso de tumores hemorrhoidaes internos que passo a descrever.

O Sr. Theodoro de Souza Ribeiro, de 41 annos de idade, alto, magro, de temperamento lymphatico e muito pallido, procurou-me em dias do mez de Julho deste anno por soffrimentos de tumores hemorrhoidaes.

Queixava-se de dores agudissimas sempre que tinha de ir á banca, acompanhadas de tenesmos rectaes e vesicaes, durando todos estes soffrimentos, dois, tres e mais dias, até que pelo constante emprego de banhos *quentes* se dissipavão estes ataques. Com a medicação empregada por dois illustrados clinicos desta capital, durante perto de dois mezes que ahi esteve, nenhuma melhora obtivera em seus padecimentos, que de dia para dia augmentavão; sendo por um dos referidos clinicos aconselhado que voltasse para o sertão, visto como, com a mudança de clima poderia melhorar, não só destes padecimentos mas ainda da anemia, e mais fortalecido, soffrer a operação dos tumores hemorrhoidaes, pois a custo tinha

resistido a uma hemorragia que durara quatorze dias, quando se achava na capital, e outra de dezoito dias quando ja no sertão, alem de pequenas perdas que tinha de vez em quando.

Procurando eu proceder ao toque rectal, foi quasi impossivel pelas dores que despertava; ficando adiado o exame para a occasião de um dos ataques referidos: com effeito dahi a alguns dias se deu essa occasião, e preveni ao doente de que no caso que fossem tumores hemorrhoi-daes, assim como meus collegas havião dito, e fosse possivel operal-os, o procederia immediatamente, por qualquer dos meios preconisados, e que estivesse a meu alcance na occasião, não só com o fim de evitar delongas, mas tambem novos exames do recto, que causavam dores extremas, por estarem os tumores tão turgidos, que com os esforços de defecação e tenesmos rectaes, ficavão meio estrangulados.

Assim procedi: — preparado para esmagar os tumores cu excisal-os; fui ver o doente, mas fiquei surpreso diante do enorme volume de cinco tumores, o menor dos quaes tinha de diametro um centimetro, e o maior teria de trez a quatro (4) centimetros de diametro; a mucosa do recto era rubra, os vasos todos turgidos não só pelo affluxo anormal de sangue, mas ainda pela compressão exercida pelo esphincter, que embaraçava a circulação.

Os tumores assim em prolapso davão ao recto um aspecto horripilante.

As hemorrhoidaes pulsavão fortemente debaixo da pólp de meu dedo, introduzido pelo pequeno espaço que mediava aos tumores, e indicavão-me a imminecia de uma seria hemor-rhagia.

Nestas condições que operação fazer-se? a ligadura simples, a ligadura com excisão, mesmo pelo processo de Velpeau? a applicação do caustico de Vienna, pelo processo de Amussat, que são os methodos mais preconisados? a estas duas ultimas operações era impossivel proceder por falta de instrumentos

proprijs, alem de serem impossibilitadas por causa da demora que requerem, ficando os tumores em prolapso, produzindo dór intoleravel; não podendo o doente chloroformisar-se, já pela posição em que devia estar para ser operado, já por ser preciso que fizesse esforços voluntarios para conservar os tumores fóra do anus, pois que tel-os nesta posição por meio de *pinças* como se aconselha, é cousa facil de indicar, porem difficillima de executar, attendendo aos soffrimentos horribéis por que tinha de passar o pobre doente, mas tambem pelo dilaceramento da mucosa, que certamente promoveria hemorrhagia, o que devia ser evitado. A ligadura simples me parece não ter nenhum resultado em tumores de tão grande tamanho, e em tão grande numero, porquanto se estrangulariam; não sendo mais possivel recolhel-os, seriam feridos de gangrena, ficando assim o doente exposto ás suas graves consequencias; isto no caso em que se podesse passar as ligaduras na parte a mais unida á parede do recto, em tumores que nada apresentavam de pediculo.

A ligadura com excisão alem de ter os mesmos inconvenientes e talvez impossibilidades da ligadura simples, tem a desvantagem de poder cahir o fio depois da excisão feita, e converter-se na operação da excisão simples, com todas as consequencias terriveis de uma hemorrhagia interna ou externa: deixando eu de pensar nas cauterisações com os differentes acidos, por serem a meu ver apenas um methodo palliativo.

Assim a braços com uma molestia que affligia o doente havia um anno, mais ou menos, de um modo extraordinario, e cuja cura seria impossivel de todo, por applicações medicamentosas, que já tinham sido feitas sem resultado por outros collegas, só havendo recurso na intervenção cirurgica, qualquer que ella fosse, e que todavia parecia nenhum exito favoravel ter, puz em execução immediata uma ideia que me veio ao pensamento. Com a seringa de Pravaz injectei dentro do tumor maior oito (8) gottas de uma solução centigrada de perchlorureto de ferro; o tumor por tal modo estava turgido

que, ao retirar a agulha da seringa, com quanto fosse a mais delgada, pelo orificio della passára um jorro finissimo de sangue.

Os tumores foram recolhidos pelo doente, que ha muito reclamava fazel-o; foram administrados banhos *mornos* na temperatura de 30 grãos centigrados, e aguardei o resultado por oito (8) dias.

As conjecturas feitas por mim, durante este lapso de tempo, são fundadas na anatomia pathologica da molestia.

Si estes tumores não são mais do que varices das veias hemorrhoidaes, que afastam, destendem e discolam a mucosa do recto, o sangue nellas contido seria coagulado pelo perchlorureto de ferro, e ainda quando oito gottas não fossem bastantes para fazel-o em totalidade, pelas grandes dimensões do tumor, todavia a pequena quantidade coagulada formaria um nucleo, sobre o qual o embate do sangue promoveria a completa coagulação, e a ampólla se obstruiria; neste caso uma das tres hypotheses seguintes seria realisada: depois do coalho formado ou elle se absorveria e d'est'arte teria desaparecido o tumor, ou se organisaria, para em seguida, passando por uma phase regressiva ser então reabsorvido lentamente, o que neste caso eu não esperaria, pois sem perigo podia fazer ablação d'elle; ou depois do coalho formado, por esforços de defecação se romperia o tumor, e o vaso *arrolhado* pelo coalho não daria mais sangue, e então poder-se-hia com uma thesoura cortar os retalhos da mucosa, si por ventura os houvesse.

Terminando-se o tumor por qualquer das hypotheses apresentadas, poder-se-hia fazel-os todos desaparecer um por um.

Com estas ideias, no fim de oito dias examinei o meu doente, não o fazendo antes deste tempo, não por falta de vontade de minha parte, mas por evitar soffrimentos a elle; no fim de oito dias, digo, examinei-o e com grande satisfação, vi que o tumor, em que tinha feito a injeccão, estava duro e de cor carregada e que trez dos mais pequenos, que lhe ficavam

do lado opposto, quasi tinhão desapparecido pela compressão por elle exercida; a coagulação do sangue no tumor tendo sido obtida quasi totalmente; todavia, de novo inda que com algum custo, pois os coagulos mais superficiaes impediam a penetração da agulha da seringa, fiz injectão de quantidade igual a um quarto de seringa, da solução centigrada de perchlorureto de ferro, e aguardei o resultado: durante o espaço de seis horas o doente sentiu dores e calor no recto e mais fortes tenesmos vesicaes, que se dissiparam sob a acção de banhos mornos e de uma poção de chloral.

Trez dias passados o doente me annunciou que por esforços de defecação havia lançado uma porção de sangue anegrado, e em dois dias consecutivos ainda se deu a mesma cousa, si bem que em menor quantidade, sentindo mais livre o recto, mais facilidade na defecação, que fazia ja quasi sem tenesmos, d'onde collegi logo que o tumor se havia rompido e evacuado; e com effeito, no fim do periodo de oito dias que a mim mesmo tinha imposto, examinei-o novamente; já não existia mais senão um tumor dos de tamanho medio, todos os outros tinham completamente desapparecido pela compressão que o tumor grande sobre elles exercia, apenas restando esse que ficára fóra de seu alcance, pois se achava acima d'elle; de modo que, immediatamente fiz n'elle uma injectão de meia seringa da mesma solução, pois animado pelo resultado obtido sobre o tumor maior não havia mais que hesitar; no fim de quatro dias rompeu-se tambem este ultimo tumor, e meu doente viu-se desta sorte livre de tão incommoda molestia, que lhe havia depauperado o organismo de um modo insolito, não só pelas perdas continuamente repetidas, mais ainda pela febre, inappetencia, insomnia e terriveis dores que erão seu cortejo.

E' verdade que ainda sentio algumas dores surdas e um pouco de peso por alguns dias, porem tudo se dissipou em pouco tempo, e no fim de quarenta dias poudeseguir a cavallo para o logar de sua residencia, que d'aqui dista cinco leguas; e na hora em que escrevo estas linhas está elle de saúde resta-

belecida, mais corado e bastante forte, como elle mesmo me annuncia respondendo a uma carta que lhe dirigi para me informar de seo estado de saúde.

Escrevo esta observação clinica com o fim de publicar um caso de cura de tão incommoda molestia, obtido por este meio evitando mais terriveis dores do que ella ja causa, e as consequencias que outro meio de tratamento pode acarretar.

O praso de quarenta dias em que foi debellada a enfermidade pode ser abreviado, não fazendo mediar entre a primeira e as demais injeccões o numero de dias que esperei, assim como fazer de começo a injeccão de quantidade igual a um quarto da seringa de Pravaz, da solução, pois que a minha hesitação era natural neste primeiro caso.

Lencões 18 de Outubro de 1883.

MEDICINA -

BERIBERI NO BRAZIL

ESTATISTICA (1) DOS BERIBERICOS DO HOSPITAL DA CARIDADE DA BAHIA, ORGANISADA POR DOMINGOS PEDRO DOS SANTOS, ESTUDANTE DA SEXTA SERIE DA FACULDADE DE MEDICINA, ADJUNCTO AO MEDICO INTERNO DO MESMO HOSPITAL E EX-INTERNO DO HOSPITAL DE MARINHA.

Anno de 1870

Entraram		7	IDADES:	
Em Março	1		De 20 a 30 annos	2
Em Abril	2		De 30 » 40 »	2
Em Junho	1		De 40 » 50 »	1
Em Outubro	2		De 50 » 60 »	1
Em Dezembro	1	7	De 60 » 70 »	1 7

(1) Eis a estatistica que promettemos publicar n'esta *Gazeta*; apesar do cuidado que tivemos na sua confecção, pôde muito bem ter acontecido escapar algum caso.

O plano aqui seguido é diverso do que tínhamos adoptado para a que iamos incluir em nossa these; assim procedemos para attender ao formato desta *Gazeta*.