

primeiro as seguintes : o ichthyol é soberano para acalmar as comições e a dôr; pôde muito bem misturar-se a preparações plumbicas ou mercuriaes sem provocar a formação de sulfuretos—Uma das desvantagens do ichthyol consiste no seu mau cheiro.

A preparação mais recommendada pelo A. é a seguinte :

Lithargyrio.....	10
Vinagre.....	30
Ferva até reduzir a 20.	

Junte :

Azeite.....	} aa 10
Banha.....	
Ichthyol.....	

F. s. a uma pomada.

O A. refere ainda um caso de favus n'uma creança de quatro annos curado em tres semanas pelo spray d'ichthyol e uma pomada composta d'ichthyol e vaselina: mais dois casos de acne rosacea em que o ichthyol lhe pareceu mais activo do que todas as outras preparações sulfuradas. Ainda não teve occasião de o empregar no prurigo, affecção para a qual o ichthyol parece mais particularmente indicado.—(*Bull. de therap.*)

TUMOR MOVEL NÓ ABDOMEN SIMULANDO RIM FLUCTUANTE. AUTOPSIA. DESLOCAÇÃO DO FIGADO.—J. S., de 34 annos, casada, foi admittida no *London Hospital for diseases of the chest*, em 4 de junho, soffrendo de phthisica adiantada e de laryngite. Enquanto esteve no hospital chamou a attenção para um tumor do lado direito do abdomen, que havia tres annos tinha notado pela primeira vez. Nenhum incommodo lhe causava, nenhuma dôr, excepto á pressão, mas então leve. Notou que a massa frequentemente se deslocava d'um lugar para outro.

Ao exame, sentiu-se um tumor no lado direito do abdomen, abaixo do rebordo costal, com os seguintes caracteres: Era solido, firme, de fórma oval, de longo eixo paralelo ao do corpo e facilmente movel. Quando a doente estava de costas, o

tumor podia ser agarrado entre o pollegar e os outros dedos na região lombar direita, mas quando se voltava sobre o lado esquerdo o tumor podia ser sentido na linha mediana do abdomen, tornando ao seu primeiro logar logo que a doente voltava a estar de costas. O rim direito não podia positivamente ser sentido na sua situação normal. Não havia som maciço abaixo do rebordo costal na posição natural, porém quando o tumor era empurrado para deante, para a superficie anterior do abdomen, achava-se o som maciço. A urina foi examinada por diferentes vezes e sempre se encontrou isenta de albumina, porém continha ultimamente um abundante deposito de uratos. Não havia historia de qualquer perturbação urinaria. Considerou-se o tumor como sendo inquestionavelmente um « rim fluctuante ». A doente morreu em julho 25.

Autopsia.—O lobo direito do figado estendia-se por tres pollegadas e meia abaixo do nivel das costellas, alcançando justamente o ponto mais alto da crista iliaca; desde a sua emergencia das costellas até abaixo, em nenhum ponto media mais d'uma pollegada de espessura. Seguindo o mesmo modo de exame, o movimento d'esta parte do figado correspondia em tudo ao que fóra sentido durante a vida: quando agarrada entre o pollegar e os outros dedos, dobrava-se ella sobre si mesma e dava assim a fórma oval e a similhaça com a do rim. Extraído, reconheceu-se que o figado pesava 48 onças e estava são. A vesicula felea continha tres calculos biliares, do tamanho de *marbles* ordinarios, com diversas faces lisas bem marcadas. A vesicula estava cheia, porém não distendida; o ducto conductor estava obturado, não recebendo a extremidade mais grossa d'uma agulha d'autopsias senão na sua entrada. O rim direito, estava na sua posição normal e são.—DR. E. SMIT.
(*The Lancet.*)

TRATAMENTO DA PHTHISICA PELO IODOFORMIO.—Desde a memoria sobre o tratamento da phthisica pelo iodoformio, lida por Semmola no congresso medico internacional de Amsterdam,