

mettida por tal regimen. A commissão, pois, considerando que para taes individuos o uso diario do acido salycilico é altamente perigoso e que mesmo para os individuos sãos não está provado que elle seja completamente inoffensivo, recommenda que se mantenha a prohibição que faz do acido salycilico como agente de conservação de artigos ou generos alimenticios.

A HYSTERIA E A DIATHESE TUBERCULOSE. —O numero de Janeiro do *Brain* começa com um artigo importante do Professor Grasset acerca das relações entre a hysteria e a diathese tuberculosa. O auctór esforça-se por provar que a hysteria como a meningite tuberculosa é uma das manifestações da diathese tuberculosa. « Em uma familia phtysica, haveis de ver entre os filhos de paes tuberculosos, um morrendo de meningite tuberculosa, outro de consumpção pulmonar, enquanto que o terceiro parece ter escapado a diathese. Este ultimo será nevrotico, hypochondriaco, hysterico e até lunatico; uma vez que elle tenha escapado a diathese hereditaria na apparencia somente. Elle é tuberculoso como os mais, posto que não tenha tuberculos aqui ou alli.

A nevrose é a manifestação da affecção diathetica neste caso. E o que prova é que se o hysterico, o hypochondriaco, o lunatico d'aquella estirpe vem a ter filhos, a diathese se apresenta frequentemente com o seu typo classico. Pae e filho desta geração phtysica não interrompem a cadeia diathetica, apenas a phtysica pulmonar é substituida pela hysteria. Ainda mais, o hysterico pode provar a natureza de sua nevrose tornando-se phtysico na segunda metade da vida; e então podem dar-se frequentemente phenomenos da alternativa e equilibrio entre as duas manifestações da mesma diathese.» Esta importante these é sustentada pelo estudo de numerosos casos que são cuidadosamente analysados.

DIETA NA TUBERCULOSE. — De um trabalho recente conclue o Dr. Bidder de Berlim que em relação aos saes alcalinos dos alimentos e a importancia que elles possam ter na etiologia e

marcha da tuberculose, elle advoga uma dieta isenta tanto quanto possivel dos saes de potassio e rica em sal commum, por ser um sal de sodio.

Sustenta o autor que este ultimo sal torna os tecidos desfavoraveis ao desenvolvimento do bacillo do tuberculo, e que nos individuos jovens com processos tuberculosos nos ossos, articulações, glandulas, pulmões, etc., meio a um grammo de sal commum deve ser dado com os alimentos tres ou quatro vezes por dia, conforme a idade. Se se der no fim de algum tempo certa repugnancia para o sal, elle poderá ser substituido pelo benzoato de soda em dozes de 0,2 a 0,5 grammos. Esta ultima substancia (conhecida como util na diarrrhéa das creanças) é de gosto agradável, aromatico, e augmenta o appetite.

O Dr. Bidder crê, além disso, que a bem conhecida inconveniencia do uso do iodeto de potassio na escrofula e no tuberculo é devida ao potassio d'este corpo e não ao iode que elle contem. A dieta deve ter, em summa, um excesso de albumina, gordura, e os saes acima mencionados. Ainda em apoio de sua these o medico de Berlim affirma a existencia de connexões entre a tuberculose e o rachitismo, e sustenta que esta ultima enfermidade tem como uma das causas um excesso de saes de potassio na alimentação.

EXTIRPAÇÃO PELA VAGINA DE UM OVARIO ADHERENTE NA BOLSA DE DOUGLAS MOTIVANDO FORTE DYSMENORRHÊA; CURA. — Na discussão que sobre a oophorectomia teve logar no congresso internacional de 1881, o Dr. Savage, de Birmingham, disse: « Tem-se considerado ser condição *sine qua non* para os beneficios da oophorectomia que se extirpem os dous ovarios; porém alguns casos ha em que a doença se limita estritamente a um lado e em que julgo seria vantajosa a extirpação do ovario affectado. Em casos apropriados, como os de prolapso d'um só ovario, tenciono fazel-o e para esse fim escolherei aquelles em que os symptomas locaes sejam bem claramente definidos e limitados e em que não haja symptomas geraes