

2.º As circumstancias susceptiveis de exercerem influencia sobre a saude publica devem ser consignadas aqui

Certifico que as informações acima foram consignadas por que pessoalmente inspecioncu o navio: que tenho todos os motivos para crer estas informações exactas, e certifico além d'isto que o dito navio deixa o porto com destino a (o nome do paiz)

Em fé do que puz a minha assignatura e o sello da minha repartição no porto de dia de de 18 horas.

(Assignatura)

(6) A *carta de saude* deve ser passada no porto de partida pelo *agente sanitario responsavel do governo territorial*.

O *consul do paiz de destinação* tem o direito de *assistir ás inspecções sanitarias* do navio, que serão feitas pelos agentes da auctoridade territorial, conforme as regras que forem estabelecidas por convenções ou tratados.

(Continúa).

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

ESTERILIDADE PRODUZIDA POR ANOMALIA DA SECREÇÃO VAGINAL.

— Na *Wien. med. Presse* publicou o Dr. Jung o caso de uma senhora de 32 annos d'idade, sempre sadia, e que com 14 annos de casada não tinha ainda tido filhos.

A menstruação era sempre regular. Para cural-a da esterilidade alguns especialistas a tinham tratado pela incisão do orificio, pela cauterisação do canal cervical, mas sem resultado. O exame mostrou que o canal cervical era completamente pervio, e feito 3 a 4 horas depois de uma copuia deixou ver pelo microscopio no sperma os spermatozoides sem movimento. Exames ultteriores domonstraram que logo depois da ejaculação existiam

ainda estes movimentos, que desapareciam depois pela acção da secreção vaginal. Jung prescreveo injeccões adstringentes na vagina e banhos de assento. Depois de tres mezes a mulher sentiu-se grávida e no termo da prenhez deo a luz uma robusta criança.

ACIDO PICRICO COMO REACTIVO DA QUININA CONTIDA NAS URINAS.— Pelo Sr. W. S. Paget. O acido picrico já foi dado como um reactivo muito sensivel da albumina nas urinas pelo Dr. George Johnson. Foi tambem aconselhado para determinar a presença da quinina, pelo Dr. Nicholson, na *Lancet* de Novembro de 1882, mas parecia que era preciso que o doente tomasse fortes doses d'este medicamento. Algum tempo depois d'esta publicação, S. Paget, examinando pelo calor e pelo acido nitrico as urinas de um moço phthisico e tendo obtido um resultado negativo, foi surprehendido de verificar com o acido picrico a producção de uma nuvem opalescente desaparecendo pelo calor. Recordou-se então de que a doente tinha tomado 6 centigrammas de quinina nos dias precedentes, mas não pensou que tão fraca dose podesse manifestar-se pela turvação das urinas. Depois de uma serie de experiencias, o autor affirma que as mais pequenas doses de quinina tomadas internamente se revelam na urina pelo acido picrico. Os outros alcaloides que se empregam diariamente: a morphina, a atropina, a strychnina, não soffrem com este acido uma reacção tão rapida, e em pequenas doses escapam a esta reacção. (*British Med. Journal*, fev. 1884 *Gaz. hebdom*).

EXTIRPAÇÃO DO RIM E CYSTOTOMIA CONSECUTIVA. — *Rawdon*.— Um rapaz de 12 annos, 24 horas depois de ter dado uma queda da altura de 8 pés, foi trazido á clinica urinando sangue e queixando-se de dôres no lado direito. A urina era alcalina, de cor castanho escura, mal cheirosa; dôres no penis e na bexiga. Diagnosticou-se uma ruptura do rim direito. 17 dias depois fez-se a nephrectomia, que confirmou o diagnostico; o rim estava completamente rasgado em dois pedaços, que foram extirpados