

ainda estes movimentos, que desapareciam depois pela acção da secreção vaginal. Jung prescreveo injeções adstringentes na vagina e banhos de assento. Depois de tres mezes a mulher sentiu-se grávida e no termo da prenhez deo a luz uma robusta criança.

ACIDO PICRICO COMO REACTIVO DA QUININA CONTIDA NAS URINAS.—Pelo Sr. W. S. Paget. O acido picrico já foi dado como um reactivo muito sensivel da albumina nas urinas pelo Dr. George Johnson. Foi tambem aconselhado para determinar a presença da quinina, pelo Dr. Nicholson, na *Lancet* de Novembro de 1882, mas parecia que era preciso que o doente tomasse fortes doses d'este medicamento. Algum tempo depois d'esta publicação, S. Paget, examinando pelo calor e pelo acido nitrico as urinas de um moço phthisico e tendo obtido um resultado negativo, foi surprehendido de verificar com o acido picrico a producção de uma nuvem opalescente desaparecendo pelo calor. Recordou-se então de que a doente tinha tomado 6 centigrammas de quinina nos dias precedentes, mas não pensou que tão fraca dose pudesse manifestar-se pela turvação das urinas. Depois de uma serie de experiencias, o autor affirma que as mais pequenas doses de quinina tomadas internamente se revelam na urina pelo acido picrico. Os outros alcaloides que se empregam diariamente: a morphina, a atropina, a strychnina, não soffrem com este acido uma reacção tão rapida, e em pequenas doses escapam a esta reacção. (*British Med. Journal*, fev. 1884 *Gaz. hebdom.*).

EXTIRPAÇÃO DO RIM E CYSTOTOMIA CONSECUTIVA. — *Rawdon*.—Um rapaz de 12 annos, 24 horas depois de ter dado uma queda da altura de 8 pés, foi trazido á clinica urinando sangue e queixando-se de dores no lado direito. A urina era alcalina, de cor castanho escura, mal cheirosa; dores no penis e na bexiga. Diagnosticou-se uma ruptura do rim direito. 17 dias depois fez-se a nephrectomia, que confirmou o diagnostico; o rim estava completamente rasgado em dois pedaços, que foram extirpados