

ainda estes movimentos, que desapareciam depois pela acção da secreção vaginal. Jung prescreveo injeccões adstringentes na vagina e banhos de assento. Depois de tres mezes a mulher sentiu-se grávida e no termo da prenhez deo a luz uma robusta criança.

ACIDO PICRICO COMO REACTIVO DA QUININA CONTIDA NAS URINAS.—Pelo Sr. W. S. Paget. O acido picrico já foi dado como um reactivo muito sensivel da albumina nas urinas pelo Dr. George Johnson. Foi tambem aconselhado para determinar a presença da quinina, pelo Dr. Nicholson, na *Lancet* de Novembro de 1882, mas parecia que era preciso que o doente tomasse fortes doses d'este medicamento. Algum tempo depois d'esta publicação, S. Paget, examinando pelo calor e pelo acido nitrico as urinas de um moço phthisico e tendo obtido um resultado negativo, foi surprehendido de verificar com o acido picrico a producção de uma nuvem opalescente desaparecendo pelo calor. Recordou-se então de que a doente tinha tomado 6 centigrammas de quinina nos dias precedentes, mas não pensou que tão fraca dose pudesse manifestar-se pela turvação das urinas. Depois de uma serie de experiencias, o autor affirma que as mais pequenas doses de quinina tomadas internamente se revelam na urina pelo acido picrico. Os outros alcaloides que se empregam diariamente: a morphina, a atropina, a strychnina, não soffrem com este acido uma reacção tão rapida, e em pequenas doses escapam a esta reacção. (*British Med. Journal*, fev. 1884 *Gaz. hebdom*).

EXTIRPAÇÃO DO RIM E CYSTOTOMIA CONSECUTIVA. — *Rawdon*.— Um rapaz de 12 annos, 24 horas depois de ter dado uma queda da altura de 8 pés, foi trazido á clinica urinando sangue e queixando-se de dôres no lado direito. A urina era alcalina, de cor castanho escura, mal cheirosa; dôres no penis e na bexiga. Diagnosticou-se uma ruptura do rim direito. 17 dias depois fez-se a nephrectomia, que confirmou o diagnostico; o rim estava completamente rasgado em dois pedaços, que foram extirpados

com todas as precauções asepticas ; houve violenta hemorragia. O rapaz melhorou, mas no 24º dia manifestou-se retenção de urina por cystite ; fez-se por isso a cystotomia lateral. No 41º dia veiu a morte com syncope e vomitos. Na autopsia acharam-se numerosos abcessos por baixo da capsula renal *esquerda*, o ureter esquerdo dilatado e o bacinete cheio de pus. Foram coagulos sanguineos em putrefacção que provocaram a cystite e esta inflammacção propagou-se para o ureter e bacinete. Se a cystotomia fosse feita mais cedo, talvez se impedisse o resultado fatal. (*The Liverpool med.-sug. J — D. Medis.-Z. — Medicina Contemporanea*).

CASO DE UTERO E VAGINA DUPLOS. — *Dirner*. — Este caso de dois uteros completamente separados e de vagina dupla, estudado por uma longa observação, é muito interessante, sobretudo no ponto de vista obstetrico. — Depois de muitos annos de casamento, em que a urethra serviu á copula, o orificio da vagina esquerda foi dilatado por um medico. — Em seguida a mulher concebeu no utero esquerdo e abortou ao 4.º ou 5.º mez. — Reclamando a doente que a operassem da incontinencia de urina que persistia, extirpou-se-lhe um borrelete em crista, parte dilacerada da parede posterior da urethra, e estreitou-se-lhe a abertura d'este canal ao mesmo tempo que se uniram as duas vaginas. Pouco depois a doente concebeu e novamente abortou ao 4.º ou 5.º mez ; era o utero esquerdo que estava gravido. Cerca de um anno depois novo parto, mas este de termo ; o feto, feminino, occupava o utero direito. — O exame combinado feito pouco tempo depois do parto demonstrou claramente que entre os dois uteros apenas havia uma união delgada, ligamentosa, que permittia completa mobilidade. Demais pôde-se reconhecer repetidas vezes que as contracções do utero direito se acompanhavam das do esquerdo, que se tornava duro e mais pequeno para em seguida se relaxar. — (*Arch. f. Genakol — D. Med.-Z. — Medicina Contemporanea*.)

OS NOVOS AGENTES THERAPEUTICOS, POR FILEHNE. — O auctor descobriu as propriedades antipyreticas, livres de todo o pheno-