

todo), hexaprodontes (com 6); distinguem-se pelo numero de incisivos que o intermaxillar supporta, durante que o resto da maxilla superior tem sempre o numero de alveolos normal (4). A falta, nos tetraprodontes, d'este incisivo, supranumerario nos hexaprodontes, é uma anomalia que o homem conseguiu pela sua civilisação, a sua persistencia um atavismo favorecido pela formação de duas arterias distinctas e sem anastomoses, em consequencia da separação do intermaxillar, analogo ao mais forte crescimento osseo do vomer por estas favoraveis relações nutritivas. Tambem os leporideos, lebre e coelho, mostram por traz do grande primeiro incisivo este terceiro incisivo, que mais tarde perdem.—A explicação da fenda labial parte do desenvolvimento do esqueleto do rosto. O labio superior é formado de 6 partes, correspondentes ao desenvolvimento dos ossos da face. Da apophyse frontal dão as apophyses nasaes internas os intermaxillares internos, as externas os externos, emquanto que dos lados veem as apophyses supra-maxillares. Como a cada uma d'estas partes corresponde uma parte do labio, entende-se como no labio leporino, isto é na falta de união de um ou de ambos os intermaxillares internos com os externos, a fenda deve passar pelo nariz, o que não é considerado na theoria de Gothe. Analogamente se explica a fenda obliqua da face, que tem a sua origem na falta de união da apophyse nasal externa com a que produz o maxillar superior e que continúa para a cavidade orbitaria como fenda estomato-orbitaria, ou é uma fenda leporina alongada, e então caminha entre o intermaxillar interno e o externo.

TECHNICA DA COSTURA INTESTINAL CIRCULAR.—Neuber (de Kie!).—As innovações feitas pelo autor na costura intestinal consistem primeiro na applicação de um tubo osseo descalcificado que é inchado para o meio e tem ahí um sulco annular. N'este tubo são escorregados os dois topos intestinaes, depois os seus folhetos serosos reunidos por uma costura circular e finalmente uma costura um pouco mais alta aperta a costura circular no anel. As vantagens d'este processo estão na facil execução, na

segurança da costura sobre uma base solida, no abrigo da ferida do contacto directo do conteúdo intestinal, na permanencia da abertura do canal. O processo foi executado com resultado em 3 homens, em cujas dejecções não se pôde encontrar o tubo; nos animaes desaparece elle 4--5 dias depois.

NOTICIARIO

SOCIEDADE MEDICO-PHARMACEUTICA DE BENEFICENCIA MUTUA.

—No dia 12 do corrente celebrou esta associação a sua 16.^a sessão annual.

Segundo o relatorio do conselho administrativo, o numero dos socios é de 111, e o seu capital é de 26:043\$750. A despeza com pensionistas foi de 1:440\$000.

O conselho pediu á assembléa que interpretasse o sentido do artigo 8.^o dos Estatutos, na parte que lhe prohibe despender mais dos dous terços dos rendimentos annuaes, com o fim de estabelecer a base para o calculo do terço que deve ser capitalisado. A assembléa deliberou que se tome por base o rendimento fixo.

Os funcionarios para o anno de 1884 a 1885, quasi todos reeleitos, são os seguintes :

Assembléa geral.—Presidente, Dr. Almeida Couto; Vice-presidente, Conselheiro Cerqueira Pinto; 1.^o Secretario, Dr. Monteiro de Carvalho; 2.^o Secretario, Pharmaceutico Augusto Alves de Abreu.

Conselho administrativo.—Dr. Silva Lima, Dr. Chastinet, Dr. Manoel Victorino, Dr. Carlos Ferreira Santos e Pharmaceutico Antonio Barretto de Menezes.

Commissão de contas.—Dr. José Ignacio de Oliveira, Dr. Santos Pereira e Pharmaceutico Adolpho Diniz.

FACULDADE DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO.—Por decreto de 14 do corrente mez permittiu-se que o lente da 1.^a cadeira de