

um penso mais barato e mais simples, sem tocar no principio. Os tres novos pensos tem a pretensão de terem juntado ao de Lister um novo principio, que até aqui só era applicado no penso crosta, o principio da dessiccação das secreções, do penso secco. E' o meio mais seguro contra a putrefacção. Nos tres pensos seccam as secreções em crosta, que não adhere porém á ferida, mas ao penso. Depois de secco, póde o penso ficar por qualquer tempo, é um penso persistente. Por estes motivos, os antisepticos volateis devem ser substituidos por antisepticos fixos. Embora a lã da madeira contenha na sua resina uma substancia antiseptica, não póde Bruns renunciar á sua embebição com o sublimado.— Finalmente o autor dá os resultados praticos do seu penso. E' elle usado ha 15 mezes e tem sido applicado em 557 operações sangrentas, entre as quaes 48 amputações e desarticulações, 44 reseccões, etc. Dos operados morreram 10, nenhum comtudo por causa do tratamento da ferida. Em feridas accidentaes houve uma vez erysipela e outra trismo. Numerosos casos favoraveis houve particularmente em relação ás cicatrizações primarias: em 48 amputações, 37 foram nos grossos segmentos dos membros; d'estas 32 curaram *per primam*. O tempo da cicatrização elevou-se a 18 — 23 dias. Em 30 extirpações estrumosas 25 curaram por primeira intenção, com suppuração 5, das quaes 3 por causa de grandes defeitos da pelle. O tempo da cura elevou-se em media a 15 dias. Em 24 casos de reseccão do joelho e desarticulações 21 curaram por primeira intenção. O autor pensa que por causa da sua simplicidade o penso secco será muito bem recebido na cirurgia de guerra e nota que já vezes auctorisadas, como Orth e Lister, se tem pronunciado em seu favor.

EXTIRPAÇÃO DA LARYNGE POR CARCINOMA. — Hahn (de Berlim). — Hahn refere os casos de 5 doentes a quem fez a extirpação da larynge por causa de carcinoma. Dois d'elles depressa morreram de pneumonia, os outros 3 apresenta-os o autor. Um foi operado ha 3 1/2 annos, tem agora 71 e está bem. Os outros são opera-

dos de mezes. No congresso internacional de Londres parecia a operação em descredito, porque se dizia soffrer a nutrição dos doentes. Não acontece isto nos tres doentes presentes, que podem beber pela canula modificada de Gussenbauer, sem que os liquidos corram por fóra. Um dos operados augmentou 30 libras no seu peso depois da operação.—A estatistica dá que de 52 extirpações totaes 24 morreram em seguida á operação ou pouco depois, enquanto que em 11 operados d'um lado só 1 morreu. Depois da extirpação total houve 14 recidivas, depois da uni-lateral 3. O perigo n'esta é portanto muito menor; os doentes fallam tão distinctamente que abandonam a canula.

UM CASO DE PHTHISICA PULMONAR TRATADA PELAS INHALAÇÕES ANTISEPTICAS, PELO SR. BURNEY YEO.—Uma moça de 15 annos apresentando todos os signaes stetosopicos de phthisica com induração pulmonar e cavernas, foi submettida as inhalações de eucalyptus a principio e depois ás de creosote. No fim de algumas semanas deste tratamento o estado geral melhorou consideravelmente, os signaes stetosopicos, porém, permaneceram os mesmos. O auctor julga que este tratamento não cura a phthisica, mas crê que demora-lhe a marcha. Elle procura refutar as duas principaes objecções feitas ao emprego das inhalações antisepticas: a 1ª é que as inhalações determinam inflammções do parenchyma pulmonar; a 2ª é que seria loucura pensar que as inhalações tenham qualquer influencia sobre os pulmões. O auctor jamais verificou a menor irritação pulmonar; se a temem habitue-se o doente pouco a pouco a ellas reduzindo a principio a dóse das substancias medicamentosas e a duração das inhalações. (*Gazette Hebdomadaire de Médecine*.—Abril 1884).

FACTOS CLINICOS PARA SERVIR A HISTORIA DA HEREDITARIEDADE DA TUBERCULOSE, PELOS SRS. L. LANDOURY E H. MARTIN.—Indagações experimentaes muito interessantes relativas a hereditariedade da tuberculose.

Estas experiencias demonstram 1º que um fragmento de