

cholecystectomy que se deve recorrer. Ao futuro pertence trazer factos novos e resolver o problema.

DAS URINAS ROSACICAS.—Verneuil.—No seu trabalho, baseado em quatro observações, o prof. Verneuil resume a sua opinião nas seguintes proposições :

1.^a A urina apresenta ás vezes nos feridos e nos operados um deposito cor de rosa, adherente ao vaso, que se reconhece á simples vista sem auxilio de reagentes e é constituido por uma materia particular a que se pode dar o nome significativo de acido rosacico.

2.^a Este phenomeno concorda em geral com a oliguria e a concentração das urinas, consequencia ordinaria do traumatismo. É precoce e mostra-se pouco depois do traumatismo; é passageiro, dura de um a tres dias e raras vezes reaparece durante o tratamento. Póde pois ser facilmente ignorado e com effeito o é á falta de ser procurado.

3.^a Póde apparecer depois de todo o genero de feridas abertas, intersticiaes ou cavitarias, e em todos os individuos fortes ou fracos, são na apparencia ou atacados de doenças constitucionaes anteriores, de modo que a sua origem e a sua significação parecem incertas; mas os exames minuciosos dos antecedentes, a concordancia com outros symptomas e emfim os resultados necroscopicos estabelecem nitidamente que está na dependencia das lesões diversas do figado: cirrhose, congestão chronica, hydatide, cancro.

4.^a As alterações hepaticas causadas pelo alcool parecem, mais que as outras, ter o privilegio de provocarem os depositos urinaes rosados sob a influencia incitadora do traumatismo; porque o symptoma observa-se frequentemente nos bebedores mais ou menos endurecidos, em seguida a accidentes cirurgicos variados e a operações diversas.

5.^a As urinas rosacicas teem pois um valor semiologico muito real, visto que annunciam quasi com certeza o estado morbido d'uma viscera importante, estado morbido muitas vezes latente

e muito difficil de reconhecer e que todavia exerce influencia mais ou menos desfavoravel sobre a marcha e as terminações das affecções chirurgicas e das lesões traumaticas.

6.^a O valor prognostico não é menos consideravel. Sem duvida o deposito urinario nem sempre é seguido de accidentes no logar ferido; sem duvida a gravidade d'esses accidentes, se se mostram, está, em relação com a extensão, o grau e a forma das lesões traumaticas; todavia importa saber as complicações a que estão expostos os feridos ou operados com urinas rosacicas: ora, esses accidentes são, segundo a minha experiencia, hemorragias consecutivas e gangrena.

7.^a Para prevenir tanto quanto possivel ou combater essas temiveis complicações, é preciso assegurar a hemostase e a asepsia no foco traumatico, utilizando todos os meios modernos e dirigir simultaneamente o tratamento medico, antes, durante e depois da operação e da ferida, á affecção hepatica e principalmente á sua causa.—Embora a therapeutica da cirrhose hepatica esteja pouco adiantada, não se desprezará nenhum dos seus recursos nos bebedores feridos ou a ferir, cujas urinas sejam rosacicas.

OS BACILLOS DA SYPHILIS.—O Dr. Sigmund Lustgarten, assistente da clinica dermatologica de Kaposi, apresentou ao Congresso de Medicina Interna dos medicos allemães uma comunicação sobre uns bacillos da syphilis, *desconhecidos até ao presente, bem caracterisados e constantes*, muito semelhantes pelas propriedades morphologicas e córantes, bem como pela sua existencia em granulações, aos da lepra e da tuberculose. Representam varinhas rectas, ou curvas mais ou menos regularmente, de côr azul carregada. O seu comprimento é em geral de 3,5 a 4,5 *u*, ás vezes apenas de 2,3 *u*, raras vezes mais longos que 7 *u*; á vista a grossura figura ser de $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{10}$ *u*. Sob fracos augmentos apresentam contornos regulares e lisos, ás vezes com leves tumefacções nas extremidades em fôrma de botão; sob a immersão homogenea ($\frac{1}{10}$...