

INDEX THERAPEUTICO

PEPTONA NA CACHEXIA ESCROFULOSA

COMMUNICADA Á ACADEMIA DE MEDICINA PELO SR. DR. SEBASTIÃO
LABASTIDE, MEDICO EM CHEFE DO HOSPITAL S. NICOLÃO,
NO MEXICO

Conceição Rendon, de 9 mezes de idade, nasceo um mez antes do tempo, em razão dos desgostos que sua mãe teve com a doença e a morte de um outro filho. Nos primeiros tempos da amamentação, a recém-nascida definhava, pois a mãe já muito abatida, impressionava-se ainda mais, vendo sua filha mingoar por falta de nutrimento, e não querer tomar nada, nem pegar em seio extranho.

Com a primeira dentição, como quasi sempre acontece, declararam-se os symptomas de inflamação do intestino, e a cumpção veio a passos largos; n'este estado já bastante grave appareceram aphtas na bocca que impediam a criança de pegar no seio; ia ella definhando e estava em perigo de vida por falta de alimentação. A vista d'isto, resolvi empregar a peptona. Mandei que se administrasse de quatro em quatro horas um clyster composto de 20 grammas de leite e 10 grammas de peptona Defresne, ao qual se misturava de vez em quando duas gottas de laudano; com esta nutrição feita durante dois mezes sustentamos a criança e completamente melhoramos pouco a pouco o seu estado. Conseguimos cural-a de todo, administrando depois pela bocca algumas doses de 10 gottas de peptona misturadas com leite fraco, e pouco, da mãe, ou com tapioca. Tendo desaparecido os symptomas d'esta grande cachexia, a criança fortaleceu-se, e acha-se agora fóra de perigo e em bom estado, devido elle á Peptona Defresne, que ella tomou durante cinco mezes somente, nas circumstancias que acima descrevemos.

(*Actas da Academia do Mexico*, 15 de Julho.)