

appello do Sr. Dr. Carlos Costa, deixando de enviar os escriptos que possuem ou de que são auctores.

Entretanto não se pode deixar de dizer e reconhecer que o Sr. Dr. Carlos Costa sahiu-se muito bem da empresa, e que foi muito além do que parecia possível neste paiz tão indifferente ainda a trabalhos desta natureza.

Quanta riqueza jazia ignorada!

Até a publicação deste, ainda incompleto catalogo, não eram só os estrangeiros que desconheciam os nossos trabalhos, eram também os proprios brasileiros.

Assim, pois, parece que não ha elogio bastante para exaltar o serviço que o Sr. Dr. Carlos Costa prestou ao paiz e á medicina brasileira.

Bahia, Feira de Sant'Anna, Setembro de 1885.

Dr. J. REMEDIOS MONTEIRO.

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

A ELECTRO-PUNCTURA NO TRATAMENTO DOS ANEURISMAS.—A' Academia Imperial de Medicina o Sr. conselheiro Saboia communicou que praticara a operação de um aneurisma da subclavéa direita, pelo electro-punctura, em um individuo branco, portuguez, de 28 annos de idade, de temperamento sanguineo, de constituição forte e pescador de profissão. Esse individuo referio-lhe que ha um mez pouco mais ou menos começara a soffrer dores atrozes que se estendião da espadua ás extremidades da mão do lado direito: que esteve em tratamento na enfermaria homœopathica do hospital da Misericordia; porém que, não experimentando melhoras, se retirára no fim de poucos dias, tendo a affecção sido designada debaixo do nome de nevralgia.

Logo depois entrou de novo para o mesmo hospital, sendo então enviado para a enfermaria a cargo do orador. Este, examinando-o, encontrou facilmente na fôssa supra clavicular di-

reita uma saliência sem mudança alguma na coloração da pelle, e dotada de movimento de expansão e de um ruido de sopro aspero. O tumor tinha o volume de um pequeno ovo de galinha, com a fôrma espheroidal, e se achava limitado do lado interno pelo sterno mastoidiano, em baixo pela clavicula e acima e do lado externo pelo musculo trapesio. Não havia differença entre as pulsações da carotida direita e as da esquerda, mas emquanto que o pulso do lado esquerdo era forte, cheio e vibrante, o do lado direito era pequeno, filiforme e quasi imperceptivel. O traçado sphygmographico do radial esquerdo dava uma curva pronunciada e igual, o do lado direito fornecia uma linha horisontal com pequenas insignificantes oscillações.

Não restava duvida que se tratava de um aneurisma da subclavea direita, e este diagnostico foi confirmado pelos adjuntos da 1ª cadeira de clinica da faculdade, bem como pelos illustres professores Martins Costa, Benicio de Abreu, Martins Teixeira, Barão de Maceió, Severiano Magalhães, Góes de Vasconcellos, Ribeiro de Mendonça, e pelo Dr. Martins Pinheiro.

A' vista da séde do aneurisma, só se podia pensar na applicação ou da ligadura ou da electro-punctura. Nem o tratamento pelo methodo de Vasaiva, nem pelos meios medicos, como o iodureto de potassio, ou os preparados de chumbo, poderia ser admittido, á vista dos resultados negativos e perniciosos que têm sido observados em outros muitos casos de aneurisma. O tratamento pela injectão subcutanea de ergotina ou pela electrificação cutanea não é digno de confiança. As injectões de perchlorureto de ferro não poderião nunca ser empregadas, pois que tornava-se de todo impossivel fazer uma compressão mais ou menos demorada sobre a arteria acima e abaixo do tumor, até que a coagulação se realizasse, e não era possivel preencher esta condição, além de que os coalhos resultados das injectões de perchlorureto são friaveis e de facil desaggregação. A ligadura pelo methodo de Hunter ou de Anel, entre o tumor e o coração não era admissivel, pois que a ligadura da subclavea para den-

tro dos scalenos é difficilima, e o resultado tem sido constantemente desastroso. Só era possível a ligadura pelo methodo de Brasdor ou de Wardrop, isto é, a laqueação da axillar; mas não só esta operação é grave, como também os seus resultados não são geralmente favoraveis. O caso era, pois, muito apropriado para o emprego da electro-punctura, também chamado galvano-punctura ou lectrolysis.

O processo empregado foi o de Hogdeon ou a mono-electro-punctura, isto é, depois de introduzidas no sacco aneurismatico duas finissimas agulhas de tilhium, convenientemente revestidas, com excepção das pontas, de uma camada de verniz, foram as extremidades dellas collocadas no pólo positivo de uma pilha de Gaiffe, que devia funcionar com 14 elementos e com o mesmo gráo de tensão; o polo negativo foi preso a uma pelota collocada sobre o tronco e distante do aneurisma.

A sessão durou 35 minutos, no fim dos quaes o tumor se tornou tenso e deixou completamente de pulsar, não tendo havido o mais ligeiro accidente. O facto foi verificado pelos professores já citados e por outros medicos que estiverão presentes á operação.

A electro-punctura não tem sido empregada entre nós por muitos cirurgiões; e não consta que ella tenha sido applicada nos aneurismas, senão uma vez pelo Dr. Antonio da Costa e outra vez pelo Cons. Saboia em um aneurisma da porção ascendente da aorta. E' esta a terceira applicação do meio que tem sido apregoado e aperfoçoado em sua technica pelo professor Ciniselli.

O Cons. Saboia communicou ainda que este anno obteve, em dous doentes affectados de aneurisma da poplitêa, a cura definitiva e sem accidente algum, por meio da compressão indirecta, exercida com o simplissimo apparelho do professor Vallete, de Lyão, e que é preferivel a qualquer outro apparelho compressor, tanto mais quanto pôde ser arranjado pelo proprio doente, a cujos cuidados se deixa a sua applicação.

APPLICACÃO DA COCAINA.—Em uma das ultimas sessões da Aca-