

tiva therapeutica interessante, baseada sobre factos e não sobre supposições. O que é indispensavel em tentativas d'esta ordem é proceder de modo que haja a certeza de que o microbio antagonista prejudica só e exclusivamente ao microbio pathogeno, e nunca ao organismo soffredor. A luta não deve se fazer a custa do paciente».

MODO ANORMAL DO COMEÇO DA FEBRE TYPHICA POR NEURALGIAS INTERMITTENTES. — O Dr. Ruelle (de Montluçon) refere no *Boletim da Sociedade das sciencias medicas de Gannat* ter observado tres casos de febre typhoide nos quaes as primeiras manifestações foram dores neuralgicas muito violentas na cabeça.

O começo foi brusco; o periodo de abatimento e de mal estar que precede á dothienenteria faltou. No primeiro caso, que terminou pela morte, as dores lancinantes, intermittentes como nas neuralgias, foram a principio attribuidas a um resfriamento adquirido em um caminho de ferro; mas no terceiro dia a febre typhica se desenhou claramente, e as dores diminuíram muito de violencia. No segundo, as dores do mesmo genero foram a principio attribuidas a uma syphilis antiga, e depois de tres dias, tendo ellas desaparecido quasi completamente, os symptomas typhicos se manifestaram com a maior clareza. No terceiro caso os phenomenos foram identicos.

M. Ruelle insiste principalmente sobre o começo brusco da molestia, sem periodo premonitorio de mal estar e abatimento, sobre o character neuralgico da dôr e a sua desapareição quasi brusca no fim de dous ou tres dias, ao mesmo tempo que os symptomas typhicosse mostraram claramente. (*Journal de Médecine et Chirurgie*, Dezembro de 1885.)

COLORAÇÃO PARTICULAR DA PELLE APÓS O EMPREGO PROLONGADO DO ARSENICO NAS CRIANÇAS. — Os *Annaes da Sociedade Medico-Cirurgica de Liege* referem, de um jornal allemão, observações de Guaita em 14 meninos, submettidos durante