

tiva therapeutica interessante, baseada sobre factos e não sobre supposições. O que é indispensavel em tentativas d'esta ordem é proceder de modo que haja a certeza de que o microbio antagonista prejudica só e exclusivamente ao microbio pathogeno, e nunca ao organismo soffredor. A luta não deve se fazer a custa do paciente».

MODO ANORMAL DO COMEÇO DA FEBRE TYPHICA POR NEURALGIAS INTERMITTENTES. — O Dr. Ruelle (de Montluçon) refere no *Boletim da Sociedade das sciencias medicas de Gannat* ter observado tres casos de febre typhoide nos quaes as primeiras manifestações foram dôres neuralgicas muito violentas na cabeça.

O começo foi brusco; o periodo de abatimento e de mal estar que precede á dothienenteria faltou. No primeiro caso, que terminou pela morte, as dôres lancinantes, intermitentes como nas neuralgias, foram a principio attribuidas a um resfriamento adquirido em um caminho de ferro; mas no terceiro dia a febre typhica se desenhou claramente, e as dôres diminuíram muito de violencia. No segundo, as dôres do mesmo genero foram a principio attribuidas a uma syphilis antiga, e depois de tres dias, tendo ellas desaparecido quasi completamente, os symptomas typhicos se manifestaram com a maior clareza. No terceiro caso os phenomenos foram identicos.

M. Ruelle insiste principalmente sobre o começo brusco da molestia, sem periodo premonitorio de mal estar e abatimento, sobre o character neuralgico da dôr e a sua desaparição quasi brusca no fim de dous ou tres dias, ao mesmo tempo que os symptomas typhicos se mostraram claramente. (*Journal de Médecine et Chirurgie*, Dezembro de 1885.)

COLORAÇÃO PARTICULAR DA PELLE APÓS O EMPREGO PROLONGADO DO ARSENICO NAS CRIANÇAS. — Os *Annaes da Sociedade Medico-Cirurgica de Liege* referem, de um jornal allemão, observações de Guaita em 14 meninos, submettidos durante

quatro ou cinco mezes, á medicação arsenical para affecções diversas, da cór bronzçada da pelle, semelhante á da molestia de Addison.

Esta coloração começa no pescoço, e d'ahi se estende ao peito, ao ventre e ás mãos, sendo menos notada na face, nas pernas e nas costas. A preparação arsenical commummente empregada, que produziu estes resultados, foi o licór de Fowler.

A coloração da pelle apparecia, as mais das vezes, no quinto mez de tratamento, mostrando-se algumas vezes tambem quinze a trinta dias após a suspensão do medicamento, e desaparecendo por descamação 14 semanas depois de tudo. Todos os meninos observados pertenciam á classe abastada da sociedade, e eram de 2 a 10 annos de idade. (*Idem, idem.*)

ESTATISTICA MEDICA

MORTALIDADE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 1885

Durante o anno de 1885 deram-se na cidade do Rio de Janeiro 10,182 fallecimentos, comprehendidos os nascidos mortos em numero de 793, ou 9,389 não comprehendidos estes.

Esta somma da mortalidade geral apresenta uma differença para mais em relação ao anno anterior (1884) de 349 fallecimentos.

Os fallecidos em 1885 dividem-se do seguinte modo :

<i>Sexo</i>	
Masculino	6,332
Feminino	3,850
<i>Condição</i>	
Livre	9,881
Escrava	301
<i>Nacionalidade</i>	
Brazileiros	7,112
Estrangeiros	3,070