

quatro ou cinco mezes, a medicação arsenical para affecções diversas, da cór bronzada da pelle, semelhante á da molestia de Addison.

Esta coloração começa no pescoço, e d'ahi se estende ao peito, ao ventre e ás mãos, sendo menos notada na face, nas pernas e nas costas. A preparação arsenical communmente empregada, que produziu estes resultados, foi o licór de Fowler.

A coloração da pelle apparecia, as mais das vezes, no quinto mez de tratamento, mostrando-se algumas vezes tambem quinze a trinta dias após a suspensão do medicamento, e desaparecendo por descamação 14 semanas depois de tudo. Todos os meninos observados pertenciam á classe abastada da sociedade, e eram de 2 a 10 annos de idade. (*Idem, idem.*)

ESTATISTICA MEDICA

MORTALIDADE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM 1885

Durante o anno de 1885 deram-se na cidade do Rio de Janeiro 10,182 fallecimentos, comprehendidos os nascidos mortos em numero de 793, ou 9,389 não comprehendidos estes.

Esta somma da mortalidade geral apresenta uma differença para mais em relação ao anno anterior (1884) de 349 fallecimentos.

Os fallecidos em 1885 dividem-se do seguinte modo :

<i>Sexo</i>	
Masculino	6,332
Feminino	3,850
<i>Condição</i>	
Livre	9,881
Escrava	301
<i>Nacionalidade</i>	
Brazileiros	7,112
Estrangeiros	3,070

Idade

Até 7 annos.....	2,363
De 7 a 25 annos.....	1,494
De 25 a 40 annos.....	2,026
De 40 a 55 annos.....	1,678
De mais de 55 annos.....	1,811
Ignorada.....	810

Lugares dos fallecimentos

Em domicilios.....	6,847
Em hospitaes civis.....	3,180
Em hospitaes militares.....	178
Na via publica.....	4
No mar.....	23

Por semestre, a mortalidade geral foi :

No 1º semestre.....	5,201
No 2º dito.....	4,981

Por trimestre foi :

1.º trimestre.....	2,604
2.º dito.....	2,597
3.º dito.....	2,498
4.º dito.....	2,483

Por mezes a mortalidade verificou-se do modo seguinte :

	<i>Mort. geral</i>	<i>Media diaria</i>
Janeiro.....	839	27,0
Fevereiro.....	838	29,9
Março.....	927	29,9
Abril.....	877	29,2
Maió.....	866	27,9
Junho.....	854	28,4
Julho.....	858	27,6
Agosto.....	843	27,1
Setembro.....	797	26,5
Outubro.....	769	24,8
Novembro.....	805	26,8
Dezembro.....	909	29,3
Somma.....	10,182	27,8

O dia de maior mortalidade foi a 30 de Dezembro, em que se deram 56 fallecimentos, e o de menor a 31 de Outubro, em que se derão 11 obitos, como se vê do seguinte quadro :

DATAS	<i>Janeiro</i>	<i>Fevereiro</i>	<i>Março</i>	<i>Abril</i>	<i>Maió</i>	<i>Junho</i>	<i>Julho</i>	<i>Agosto</i>	<i>Setembro</i>	<i>Outubro</i>	<i>Novembro</i>	<i>Dezembro</i>
1	15	19	28	40	27	33	34	24	30	24	26	24
2	23	31	23	34	33	31	20	36	23	37	32	24
3	35	23	21	21	33	24	31	24	26	21	22	35
4	23	32	20	39	22	25	26	34	32	19	22	20
5	28	32	31	23	32	32	33	18	37	16	19	22
6	27	27	32	34	30	20	33	25	25	29	20	19
7	31	25	32	38	25	40	32	21	17	24	38	28
8	25	24	37	29	31	29	22	16	18	31	25	24
9	34	32	33	33	31	22	35	36	25	24	17	29
10	28	23	33	27	30	16	25	23	32	29	33	28
11	29	24	37	42	22	37	32	26	36	22	29	34
12	32	38	33	32	23	26	38	21	29	25	23	32
13	18	32	37	33	29	21	18	27	33	24	22	27
14	20	33	21	23	26	27	39	26	16	29	24	29
15	24	29	24	15	22	33	19	23	22	18	30	34
16	25	33	35	33	19	31	29	25	29	31	19	29
17	22	33	44	21	27	24	24	34	29	23	21	33
18	25	31	29	32	38	29	22	25	22	29	27	37
19	24	51	34	31	26	40	29	40	21	23	19	26
20	30	29	28	32	30	39	24	28	25	26	21	29
21	39	30	21	24	19	27	25	35	23	31	32	19
22	30	31	29	28	34	19	39	24	28	25	36	29
23	26	38	24	27	29	24	29	28	24	25	28	31
24	34	35	28	29	28	34	23	44	29	24	33	18
25	32	25	29	28	25	30	30	23	32	24	38	35
26	24	26	22	23	22	32	34	29	28	18	25	31
27	19	29	32	29	35	25	15	25	30	29	20	30
28	32	23	29	27	34	30	26	30	22	26	36	35
29	27	—	27	33	28	32	33	19	26	19	34	31
30	24	—	40	27	25	22	22	26	28	26	34	56
31	24	—	34	—	31	—	17	27	—	11	—	31

A mortalidade por febres foi no anno passado de 1,322 obitos, menos 118 do que no anno de 1884, e menos 2,640 do qua em 1883, como se vê do seguinte quadro da mortalidade:

FEBRES	1883	1884	1885
Febre amarella.....	1336	618	374
» perniciosa.....	600	426	545
» typhoide.....	160	157	206
Variola.....	1366	89	4
Sarampão.....	149	15	
Outras febres.....	352	135	193
Somma.....	3963	1440	1322

A febre amarella, que tem tido nestes ultimos annos um decrescimento bastante sensivel, apresentou no anno passado uma differença para menos de 244 casos em relação ao anno anterior.

Em um modesto trabalho nosso, já publicarlo, dividimos o reinado da febre amarella em tres periodos distinctos; hoje pode-se considerar em declinio o terceiro periodo dessa molestia.

A proporção da mortalidade por febre amarella no seu primeiro periodo foi de 16,2 % da mortalidade geral; no segundo periodo foi de 7,5 % e no terceiro foi de 9,2 %. No anno passado a proporção não excedeu de 3,6 % da mortalidade geral no mesmo anno.

Se considerarmos a mortalidade por todas as febres nos ultimos annos, reconheceremos que a mortalidade geral no anno passado foi a mais favoravel, representando a proporção de 12,9 % da mortalidade geral.

Eis o quadro da mortalidade por todas as febres nos ultimos oito annos:

FEBRES	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885
Febre amarella.....	1174	974	1433	912	95	1336	618	374
Febre perniciosa.....	668	552	555	472	...	600	426	545
Febre typhoide.....	208	168	178	186	...	160	157	206
Outras febres.....	285	214	208	170	749	352	135	193
Sarampão.....	52	42	14	4	...	149	15	
Variola.....	2175	197	27	127	937	1366	89	4
Totaaes.....	4562	2147	2415	1871	1781	3963	1440	1322

No anno passado o dia de maior mortalidade por febre amarella foi a 18 de maio, em que se deram 6 casos.

Por quinzena foi esta a mortalidade por diversas febres no anno de 1885 :

QUINZENAS	<i>Febre amarella</i>	<i>Febre perniciosa</i>	<i>Febre typhoide</i>	<i>Outras febres</i>	<i>Variola</i>
1. ^a de Janeiro	6	16	4	6	2
2. ^a idem	9	20	7	4	1
1. ^a de Fevereiro	11	30	11	9	—
2. ^a idem	14	29	6	13	—
1. ^a de Março	30	27	8	12	—
2. ^a idem	24	25	13	5	—
1. ^a de Abril	20	37	8	14	—
2. ^a idem	24	34	11	8	—
1. ^a de Maio	25	29	5	18	—
2. ^a idem	28	28	12	7	—
1. ^a de Junho	29	17	8	10	—
2. ^a idem	17	22	11	9	—
1. ^a de Julho	18	28	6	8	—
2. ^a idem	12	21	7	6	—
1. ^a de Agosto	9	20	7	11	—
2. ^a idem	6	17	13	11	—
1. ^a de Setembro	10	19	5	2	—
2. ^a idem	6	20	3	2	1
1. ^a de Outubro	4	11	7	3	—
2. ^a idem	4	17	6	8	—
1. ^a de Novembro	3	22	6	7	—
2. ^a idem	16	17	7	7	—
1. ^a de Dezembro	14	21	10	4	—
2. ^a idem	35	35	8	11	—
Total	374	545	206	193	4

As causas de morte no anno passado forão as seguintes:

Apoplexia e congestão cerebral..... 350

Apoplexia e congestão pulmonar	130
Affecções do fígado	289
Affecções do tubo digestivo	581
Affecções cerebro-espinhaes	555
Bronchites e pneumonias	654
Convulsões	131
Diarrhêa	55
Dysenteria	41
Erysipela	39
Febre amarella	374
Febre perniciosa	545
Febre typhoide	206
Lesões do coração	1,232
Lymphatite	131
Mortes violentas	191
Nascidos mortos	793
Outras causas	1,624
Outras febres	193
Tetanos dos recém-nascidos	178
Tuberculos pulmonares	1,754
Tuberculos mesentericos	130
Variola	4
Total	10,182

Os nascidos mortos no anno passado apresentarão uma differença para mais, em relação ao anno anterior, de 157 casos.

Ha uma progressão constante nos nascimentos de crianças mortas, o que constitue um facto pathologico de merecida observação.

Basta ver-se o augmento que tem tido de 1871 para cá, para que se presagie uma calamidade em futuro não remoto.

Eis o numero de crianças nascidas mortas desde 1871:

1871	500
1872	502
1873	578

1874	567
1875	645
1876	552
1877	604
1878	578
1879	674
1880	620
1881	675
1882	612
1883	615
1884	636
1885	793

Em 1871 a proporção dos nascidos mortos foi de 5,2 % da mortalidade geral e no anno passado foi de 7,7 %!

Este facto é digno da attenção dos poderes competentes, porque perigoso pôde ser o seu progressivo desenvolvimento, que, naturalmente, assenta-se em bases que seria de todo o ponto conveniente reconhecer.

Os tuberculos pulmonares apresentarão no anno passado uma differença para menos de 45 casos, em relação ao anno de 1884.

As lesões do coração, que em 1884 fizeram 1,003 victimas, derão no anno passado 1,232 casos, mais 229 do que naquelle anno. Esta mortalidade tambem apresenta um augmento em proporções bastante sensiveis, tornando-se digna de observação e estudo.

Em 1872 a mortalidade por estas molestias foi de 414 casos e em 1883 elevou-se a 691, dando no anno seguinte (1884) um augmento consideravel, pois contarão-se 1,003 fallecimentos.

Os demais obitos por molestias chronicas e agudas não apresentarão no anno passado augmento ou diminuição notaveis em relação ao anno anterior.

A mortalidade geral de 1885, incluindo-se os nascidos mortos, representa 3,4 % da população.

FAVILLA NUNES.