

sados contra taes suores, incluindo a atropina, dá tão bons resultados. Escusado é dizer que a tuberculose prosegue na sua evolução fatal, apesar da suppressão dos suores; mas não é indifferente poder livrar os tuberculosos de um symptoma sempre penoso e causa de enfraquecimento.—(*Journal de méd. et chirurg. pratiques*—Abril de 1886).

TRATAMENTO DA BLENORRHAGIA PELO «JACARANDÁ LANCIFOLIATA».—O *Jacarandá lancifoliata* é um arbusto elevado da America tropical, pertencente á familia das bignoniaceas-tecomeas. Tem sido, ha muito tempo, empregado pelos indigenas da Columbia no tratamento da blenorragia; e o Dr. Mendell reconheceu que a tinctura da casca d'esta planta era mais efficaz do que qualquer medicação de outro genero. Nos quatorze casos apresentados por este medico o *Jacarandá lancifoliata* conseguiu parar as secreções sem nenhuma complicação no espaço de tres semanas.

O Dr. Mundell applicou igualmente o mesmo remedio contra os accidentes syphiliticos secundarios, obtendo em todos os casos optimos successos.

Em injecções o medicamento só foi usado em dous doentes, um dos quaes havia quatro mezes que soffria do corrimento blenorragico e outro soffrendo do mesmo mal, porém já no estado chronico.

Além das quinze gottas de tinctura de jacarandá que elles tomavam internamente faziam injecções do mesmo remedio com dez gottas de tinctura em 30 grammas d'agua. (*Journal de Médecine de Bordeaux*).

INJEÇÕES SUB-CUTANEAS DE QUININA.—O Dr. Aitken passa em revista os diversos inconvenientes consecutivos ao uso das injecções sub-cutaneas de quinina. Os mais importantes manifestaram-se sob o forma de envenenamento septico, de inflamação no trajecto das veias e sciaticas dolorosas e tenazes. Estes inconvenientes são raros, sendo mais frequentes os seguintes: irritação, erythema e ulcerações extensas da pelle,