

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

ANESTHESIA MUSCULAR. — Na Sociedade de Biologia, sessão 24 de Julho, proximo passado, foi apresentada, em nome de M. Brown-Séguar, uma nota sobre a pathogenia da anesthe-sica muscular, cujo resumo é o seguinte:

«Muitas pessoas se admiram de ver os experimentadores tão pouco de accordo sobre este assumpto. Suas experiencias são mal feitas? não; o erro que elles commettem não vem do modo experimental empregado, mas porque para elles a perda de função consecutiva á destruição de um centro nervoso é devida á suppressão da conductibilidade, emquanto que, na realidade, como já demonstrei, ella é devida a um effeito de inibição.

Já repeti, e não cessarei de fazel-o, que é a uma acção inhi-biteriã que é attribuida a anesthesia em todas as lesões da medulla espinhal.

Outro ponto: Me tem succedido muitas vezes, ha oito annos, ver, em um cão acommettido de anesthesia de um membro posterior, a sensibilidade voltar quando se excita fortemente a pelle do dito membro, chegando até a observar a hyperes-thesia.

Em um cão ao qual se secciona a metade direita da medulla espinhal excitei a parte anesthesiada com uma corrente mais ou menos forte, e só obtive effeitos quando a corrente chegou a ser 700 ou 800 vezes mais forte que a que é sensivel na lingua. No fim de algum tempo a corrente sensivel á lingua produzia dor. Emfim, pouco a pouco a força de excitações cada vez mais fracas, acabei por ver reapparecer a sensibili-dade nova.

Minhas conclusões, são, pois estas:

- 1.º A anesthesia proveniente de uma lesão da medulla espi-nhal não vem de uma interrupção na conductibilidade, mas é devida a uma acção inhibitoria.
- 2.º De factos numerosos resulta que esta anesthesia pode

desapparecer sob a influencia de excitações mechanicas e galvanicas. (*Tribune Médicale*).

OPERAÇÃO DE BATTEY.—M. Terrillon acaba de communicar, na sessão de 28 de Julho passado da Sociedade de Cirurgia de Paris, uma observação da ablação de dous ovarios e duas trompas (operação de Battey), devida a uma nevralgia utero-ovariana com irradiação na bacia, e que foi coroada de bom exito.

Tratava-se de uma mulher de 46 annos de idade, cujas regras, que appareceram na idade de 16 annos, tinham sido sempre dolorosas e abundantes, sem metrorrhagias. Na idade de 36 annos, foi ella acommettida pouco a pouco de dores vivas no baixo ventre, com espasmos na região uterina e nas regiões ovaricas alternadamente, e na parte anterior da bacia. Este estado, que se acompanhava de crises nervosas com ataques ligeiros, necessitou de tratamentos variados, que apenas produziram uma melhora ephemera. O estado geral da mulher estava compromettido, o emmagrecimento era consideravel, tornando-se insupportaveis as relações conjugaes, por muito dolorosas.

Após diversos tratamentos infructiferos, a senhora sujeitou-se, em 1883, a uma operação, que diz ella ter sido a ablação do collo do utero. O resultado foi nullo, as dores augmentaram e invadiram a bexiga e o rectum, tornando a vida um continuo soffrimento.

Depois ainda de uma serie de tratamentos medicos, com bromuretos, duchas, etc., todos inefficazes, a doente dirigio-se no começo d'este anno, a M. Reclus, que praticou diversas operações, como fossem: dilatação do collo vesical, dilatação do esphincter do anus, cauterisação punctuada do collo do utero, todas sem nenhum accidente, apparecendo, porém, depois disso, phenomenos dolorosos no utero e nos ovarios, com manifestações hysteriformes muito notaveis.

Foi n'estas condições que M. Reclus, tendo antes ouvido o