

inutil. Para evitar as mudanças de capacidade da bexiga que compromettem a solidez da sutura, não se deixará sonda permanente, mas deve-se repetir o catheterismo.

TUBERCULOSE PRIMITIVA DAS BOLSAS. *Reclus*. -- A tuberculose primitiva das bolsas offerece isto de particular -- que tem por consequencia a hernia do testiculo através da perda de substancia cutanea: o fungo de Lawrence, de Deville, de Jarjavay tem por origem, não uma tuberculose do epididymo, mas a fusão de um ou muitos nucleos caseosos primitivamente depositos nas tunicas escrotaes.

Deville admittia a formação tuberculosa primitiva do epididymo: a lesão ulcerativa caminharia de dentro para fóra e determinaria a formação do fungo, uma vez furada a pelle. Recolhemos observações em desaccordo formal com esta doutrina.

O primeiro factó refere-se a um vendedor de vinho atacado pelo que se chama o fungo do testiculo: a castração operada mostrou que o testiculo não offerecia tuberculos no estado de maturação e simplesmente fazia hernia através d'uma perda de substancia cutanea pela ulceração de gommas tuberculosas da pelle.

No nosso segundo caso, pode-se ver progressivamente fazer-se a saída do testiculo. Tratava-se d'um homem de 26 annos tendo apresentado abscessos consecutivos das bolsas, cuja abertura deixou ficar fistulas; essas fistulas, reunindo-se formaram uma grande perda de substancia cutanea, através da qual se viu vir o testiculo e o epididymo. Nem um nem outro d'esses órgãos estava amollecido pelo processo tuberculoso.

Essa affecção, o fungo ou a hernia do testiculo, deve portanto ser muito nitidamente separada da tuberculose do testiculo. O testiculo tuberculoso dá logar a fistulas que se abrem atrás e dentro, no ponto em que elle está mais proximo da pelle; a hernia simples faz-se antes adiante e fóra..

No fungo do testiculo é ordinario ver sã a glandula do outro

lado; a tuberculose testicular, pelo contrario, é muito habitualmente dupla.

Emfim, com a theoria das lesões glandulares, como explicar os successos obtidos pela operação de Syme? Este auctor desbrida o orificio escrotal, cujas partes doentes resecca, e depois, sem tirar o testiculo, pratica a sutura. Por isso, pensamos que a hernia do testiculo tem por origem a abertura d'uma gomma escrofulosa das bolsas e não, como falsamente se tem pretendido, as ulcerações do escroto consecutivas ao amolecimento dos focos epididymarios.

TRATAMENTO ORTHOPEDICO COMPARADO COM O TRATAMENTO CIRURGICO NOS PÉS TORTOS. *Martin*. — Recolhi com o Dr. Martin, de Lausanne, 180 observações de pés tortos tratados somente pela electricidade, pela maçadura e pela orthopedia, e vi que sempre os resultados tinham sido perfectos. Para as creanças este simples tratamento é o tratamento a escolher.

Se se trata d'um pé torto congenito, reductivel, é claro que não se recorrerá a nenhuma operação sangrenta.

Se o pé torto é irreductivel, pôde haver retracção tendinosa, lesão paralytica ou deformidade ossea. As retracções tendinosas são tratadas pelas tenotomias, mas no maior numero de casos ha recidiva e o tratamento é muito mais penoso e mais longo do que se se tiver contentado com o tratamento orthopedico. Se se tem um pé torto paralytico, deve-se ir buscar os musculos paralyzados e não seccionar os musculos sãos. Aos pés tortos irreductiveis por deformidades osseas, oppõe-se o tratamento pela faca. Mas as consequencias não são excellentes; pode-se ler isto na these de aggregação de Schwartz.

Na minha opinião, sobretudo para as creanças, o tratamento do Dr. Martin, de Lausanne, tratamento renovado de Venel é muito mais conveniente. N'um primeiro periodo chamado de preparação fazem-se manipulações, gymnastica, electricidade, mais tarde, no periodo de endireitamento, seguem se os mesmos processos, junta-se a applicação do tamanco de Venel e