

lado; a tuberculose testicular, pelo contrario, é muito habitualmente dupla.

Emfim, com a theoria das lesões glandulares, como explicar os successos obtidos pela operação de Syme? Este auctor desbrida o orificio escrotal, cujas partes doentes resecca, e depois, sem tirar o testiculo, pratica a sutura. Por isso, pensamos que a hernia do testiculo tem por origem a abertura d'uma gomma escrofulosa das bolsas e não, como falsamente se tem pretendido, as ulcerações do escroto consecutivas ao amollecimento dos focos epididymarios.

TRATAMENTO ORTHOPEDICO COMPARADO COM O TRATAMENTO CIRURGICO NOS PÉS TORTOS. *Martin*. — Recolhi com o Dr. Martin, de Lausanne, 180 observações de pés tortos tratados somente pela electricidade, pela maçadura e pela orthopedia, e vi que sempre os resultados tinham sido perfectos. Para as creanças este simples tratamento é o tratamento a escolher.

Se se trata d'um pé torto congenito, reductivel, é claro que não se recorrerá a nenhuma operação sangrenta.

Se o pé torto é irreductivel, pôde haver retracção tendinosa, lesão paralytica ou deformidade ossea. As retracções tendinosas são tratadas pelas tenotomias, mas no maior numero de casos ha recidiva e o tratamento é muito mais penoso e mais longo do que se se tiver contentado com o tratamento orthopedico. Se se tem um pé torto paralytico, deve-se ir buscar os musculos paralysados e não seccionar os musculos sãos. Aos pés tortos irreductiveis por deformidades osseas, oppõe-se o tratamento pela faca. Mas as consequencias não são excellentes; pode-se ler isto na these de aggregação de Schwartz.

Na minha opinião, sobretudo para as creanças, o tratamento do Dr. Martin, de Lausanne, tratamento renovado de Venel é muito mais conveniente. N'um primeiro periodo chamado de preparação fazem-se manipulações, gymnastica, electricidade, mais tarde, no periodo de endireitamento, seguem se os mesmos processos, junta-se a applicação do tamanco de Venel e

nunca se põe apparelho gessado ou sylicatado que prende os musculos favorecendo a sua atrophia. Emfim, no periodo de convalescença, poem-se as botinas, sobre as quaes se applicam diversas armaduras para prevenir as recidivas.

Eu divido assim os pés tortos: Ha os pés tortos congenitos accidentaes que talvez dependam de complicações da vida uterina, como enrolamento do cordão, prenhez gemellar, falta ou abundancia de liquido amniotico. N'estas circumstancias os musculos teem conservado a sua firmeza, chega-se facilmente á cura.

Ha os pés tortos congenitos paralyticos. A mãe percebeu movimentos precipitados, convulsivos, do feto, e a creança nasce com um pé torto que se reproduz logo que se tem reduzido. Sem duvida, houve affecção nervosa analoga á paralyisia atrophica da infancia. N'esses casos os bons resultados do tratamento fazem-se esperar por muito tempo.

Ha os pés tortos adquiridos, quer por causa de paralyrias, quer por causa de traumatismo. Os primeiros são ainda tributarios do tratamento que preconiso: os outros, pelo contrario, são muito rebeldes e podem e devem então dirigir-se aos recursos da cirurgia operatoria.

METEOROLOGIA

RESUMO DAS OBSERVAÇÕES METEOROLOGICAS DO MEZ DE NOVEMBRO

Pelo Conselheiro Dr. Rosendo A. P. Guimarães

A temperatura média do mez foi 26°,75; no mesmo mez do anno passado 26°,38. A temperatura ao sol, na média, 38°; no mez do anno passado 36°,50. A temperatura maxima 28°,75; no mez do anno passado 29°. A minima 23°,50; no mez do anno passado 24°. A média maxima dos dias 27°,45; no mez do anno passado 27°,16. A média minima das noites 25°,77; no mez do anno passado 25°,24.