

A COCAINA E SUA ACCÃO LOCAL NA HYDROPHOBIA. — Apezar dos especificos hoje já conhecidos e em via de completa introdução para a cura da hydrophobia não é inutil assignalar um meio de tratamento que parece poder prestar grande serviço durante um dos periodos mais dolorosos d'esta intoxicação.

O Dr. Keegan ensaiou, para combater os espasmos pharyngianos e a impossibilidade da deglutição, o uso das applicações locaes da cocaina. Eis aqui o resumo de suas observações: Trata-se de individuos, já idosos, mordidos já havia seis semanas. A impossibilidade da deglutição era quasi absoluta; mas depois de tres lavagens praticadas com uma solução de cocaina a 4 por 100 chegaram a experimentar melhoras tão consideraveis que as difficuldades cessaram repentinamente. Nos dias subseqüentes á primeira applicação o emprego foi feito com a solução a 20 por 100, o que muito concorreu para determinar o bom exito da cura. Em alguns casos as melhoras deram-se, porém com a repetição dos soffrimentos, alguns dos quaes tão intensos se tornavam que chegaram a produzir a morte. (*Indian medical Gazette*, 1886. Abril).

TRATAMENTO DA METRORRHAGIA. — Segundo o Dr. Lutaud as diversas formas da metrorrhagia são combatidas de um modo muito effcaz pelo chlorhydrato de ergotina crystallizado, que substitue vantajosamente as preparações de ergotina e de ergotina propostas até agora. Eis aqui a formula do Dr. Lutaud:

Chlorhydrato de ergotina 1 centigramma
 Agua distillada 10 grs.

Para injeções hypodermicas, meia seringa de duas em duas horas, até o desaparecimento da hemorrhagia.

A solução deve ser contida em um frasco amarello, e só se conserva durante quinze dias. Este medicamento poderá tam-
 hem ser empregado nas hemorrhagias *post partum*, onde sua accão é immediata. (*Journal de medicine de Paris*).