

R. Carbonato de ammoniaco 1 gramma
 Infusão de jaborandi 120 «

Mande para tomar um calice de duas em duas horas.

Dia 25; a melhora era muito sensivel, a temperatura baixara a 38 grãos e o pulso a 85 pulsações por minuto.

Dois dias depois a temperatura era a mesma, o doente accusava dôres no ventre e a pelle conservava-se secca; receita-mo-lhe:

R: Oleo de ricino 60 grammas

Mande para tomar de uma vez.

Idem: Tintura d'aconito 2 grammas

Agua 200 «

Mande para tomar aos calices durante a noite.

No dia immediato, 28, as dôres tinham desaparecido, a temperatura era normal, tudo emfim corria bem, nos dispensando assim da nossa assistencia. A doente restabeleceu-se.

PATHOLOGIA INTERTROPICAL

CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DAS FEBRES INTERTROPICAES

Pelo Dr. GRALL

Médico de 1ª classe da marinha franceza

(Continuação da pag. 265)

Dous factos caracterisam a cura, de um lado a menor elevação de temperatura, e do outro a menor duração do accesso, a remissão começando mais cedo e mantendo-se por mais algum tempo.

Sob a unica influencia do repouso, quando os doentes não estão extenuados pela fadiga ou pela chronicidade da molestia, a cura se opera em poucos dias, o organismo retemperando-se como se de nada tivesse soffrido.

Posso a respeito citar o caso de um arabe, que regeitava obstinadamente o sulfato de quinina. Este individuo, de nome Maklouf, caçador da Algeria, foi accommettido, a 19 de Agosto de 1885, de febre remittente palustre, após quatro mezes de estada em Tonkin.

A principio começou apresentando os seguintes symptomas: febre ardente, pelle secca, estupor, embaraço gastrico muito pronunciado, baço e figado crescidos e transpiração nenhuma. Até o fim do quarto dia de tratamento este estado se mantém, apparecendo-lhe apenas profusa transpiração. A partir do quinto dia começa a attenuação progressiva dos phenomenos morbidos, e o doente entra em franca convalescença.

Durante a pyrexia a temperatura foi:

	Manhã	Meio dia	Tarde
19 de Agosto	—	—	39°
20 » »	39°,6	39°,8	39°
21 » »	39°,4	39°,8	39°,6
22 » »	39°	39°,6	38°,8
23 » »	38°,5	39°,7	39°,2
24 » »	38°,4	38°,5	38°,4
25 » »	37°,6	37°,9	37°,2
26 » »	37°,5	37°,6	37°,4
27 » »	36°,5	37°	36°

Dous periodos bem distinctos se pode notar n'esta marcha febril: (a) febre frusta incompleta, denunciando mais um estado de anemia palustre; (b) febre pseudo-continua sendo a temperatura maxima ao meio dia. A febre se mantém, do dia 19 ao dia 24 de Agosto, em uma temperatura mais ou menos constante. Depois vem a declinação, acompanhada de mal estar geral, emaciação rapida n'esta crise e por fim o restabelecimento prompto.

Com este caso podem ser comparados os seguintes:

Obs. I. — Man, artilheiro do regimento n. 12, accommettido de impaludismo dous mezes depois de estada em Tonkin.

Queixa-se de cephalalgia, vertigens, fadiga extrema, prostração e estado subtyphoide. Sentindo-se ha oito dias doente, quiz não obstante continuar em suas occupaões habituaes; mas lhe sendo penoso fazel-o apresenta-se á visita medica em 10 de Março. Apresentava a pelle quente e secca, embaraço gastrico muito intenso, figado e baço tumefeitos, urinas coradas, em pequena quantidade, mas sem albumina, accusando, além disso, insomnia absoluta durante tres noites e delirio emquanto procurava adormecer.

Nos dias subseqüentes a temperatura foi :

	Manhã	Meio dia	Tarde
10 de Março	39°,6	40°	39°,2
11 " "	39°	39°,8	38°,8
12 " "	39°,6	39°,7	38°,4
13 " "	38°,6	38°,6	37°
14 " "	36°,5	37°	37°

O tratamento foi exclusivamente feito com a ipecacuanha e a quinina em solução, sendo a primeira applicada pela manhã, e a segunda á tarde, na dóse de 1,gr.50. (duas vezes, ás 5 e ás 8 horas.)

Obs. II. — Balaz, brigadeiro do regimento n. 12, accommettido de febre depois de estar em Tonkin ha dous mezes.

Achando-se indisposto por alguns dias continúa entretanto no serviço, até o dia em que se apresenta á visita medica. Apresentava a pelle quente, cephalalgia intensa, que datava de cinco dias, fadiga extrema, accusando insomnia, embaraço gastrico e vomitos biliosos na vespera. Durante tres dias continúa neste estado, apparecendo no quarto dia uma remissão longa da febre, sem comtudo desaparecer a insomnia e a cephalalgia até os dous dias seguintes. Passado este periodo o doente cae em convalescença.

A temperatura foi :

	Manhã	Meio dia	Tarde
10 de Março	39°,6	40°	39°,2
11 » »	39°	39°,8	38°,8
12 » »	39°,4	39°,7	38°,4
13 » »	38°,6	38°,6	37°
14 » »	36°,5	37°	37°

O tratamento foi o mesmo indicado na observação precedente, sendo o uso da quinina continuado durante os sete dias depois da declinação da febre, em dóse, porém, menor.

Casos graves. — E' mais tardia a remissão de um gráo de mais que no principio. A's vezes isto mesmo pode falhar, e a temperatura manter-se durante quatro ou cinco dias tão continua como na dothienenteria. O abatimento é extremo, ficando o doente em um estado typhoide caracterisado pela seccura da lingua, os labios fuliginosos, adynamia extrema, prostração intellectual e até delirio.

O doente pode succumbir n'este estado; entretanto as mais das vezes, no ultimo periodo, estabelece-se uma especie de estado semi-comatoso. N'estes casos acha-se na urina a albumina em quantidade notavel, symptoma este bastante grave e que indica um prognostico desvantajoso.

O exame da temperatura na curva comprehendida pela manhã, o meio dia e á tarde é um elemento ainda do prognostico, ao mesmo tempo que é a base do diagnostico differencial.

Obs. I. — Letend, conductor da decima primeira bateria do regimento n. 12 d'artilharia, 12 mezes de estada em Tonkin, estado geral excellente, raros accessos anteriores de febre intermitente simples.

Achando-se doente ha oito dias teve de supportar os accessos palustres diariamente, bem caracterisados e intermitentes, os quaes se tornaram subintrantes dous ou tres dias depois. Os symptomas foram: fadiga extrema, vertigem, dyspnéa, cephalalgia forte, insomnia completa, embaraço gastrico bem accentuado, baço e figado bastante desenvolvidos.

O doente desde o dia immediato ao da entrada apresentou um estado subtyphoide, com delirio activo á noite e alteração das faculdades, sem comtudo accusar phenomenos abdominaes e sim a appareição de uma miliar muito abundante e quasi ecchymotica, simulando até a erupção muricolor do typho petechial. Durante os cinco primeiros dias do tratamento mantêm-se este estado; no sexto a remissão torna-se notavel e a temperatura baixa, tendo apresentado a seguinte oscillação :

	Manhã	Meio dia	Tarde
27 de Março	39°,2	38°,5	40°,1
28 » »	40°	40°,4	40°,2
29 » »	39°	40°	40°
30 » »	38°,3	40°	39°,5
31 » »	39°,2	39°	38°,5
1.º de Abril	38°	38°,8	38°,5
2 » »	35°,6	37°,6	38°
3 » »	36°,5	36°	36°
4 » »	36°,4	36°,7	36°,5

A queda da temperatura coincide com uma verdadeira crise de transpiração profusa, que se manteve nos dias 1 e 2 de Abril, produzindo-se ao mesmo tempo uma verdadeira crise urinaria e desaparecendo n'esta data a albumina que existia na urina.

O tratamento consistio na poção com ipeca, no começo; e a a quinina (1 gr. 50) prescripta nos tres primeiros dias pela tarde, a partir do dia 30.

O accesso n'este caso era mais tardio que nos casos citados mais acima, começando pouco antes das 6 horas da manhã. A este respeito é bom observar que este doente não estava mais sob a primeira impressão da malaria, tendo tido já diversos accessos do mesmo mal. Este caso pode entrar no grupo definido sob o titulo de—febres typho-malarias, o que melhor se acreditará com a leitura da observação que segue.

Obs. II.—E' este um caso de autotyphisação em um paludoso, cuja segunda phase da molestia é exclusivamente typhica.

São factos analogos que caracterizam as febres dos pantanos em geral, observadas principalmente nas circumstancias de immediata intoxicação que cria a existencia no meio das florestas virgens, longe de toda a habitação e de soccorros, sem que se possa moderar ou remediar qualquer incommodo ou fadiga de origem miasmatica.

Lard..., do quarto regimento, partido de Hanouï ha cinco dias como tangedor de bois. Antes de sua partida sentia-se incommodado, com dor de cabeça intensa, prostração e fadiga, accusando que tivera febre subcontinua logo no segundo dia da viagem, sendo os accessos pela manhã. Na occasião de entrar para o hospital ardia em febre, tinha a pelle secca, accusava delirio e torpor intellectual, apresentava a lingua saburrosa, baço e figado desenvolvidos, albumina nas urinas, e no quinto dia estado typhoide completo. No duodecimo dia o doente apresentava tambem escharas nas nadegas, e no fim do primeiro septenario erupção confluyente generalisada a todo o corpo por manchas arroxadas, symptoma que existio até os ultimos dias. O doente continuou cada vez mais grave, até que appareceu-lhe uma parotidite intensa, de evolução rapida, que o fez succumbir mais depressa ainda.

A temperatura foi:

	Manhã	Meio dia	Tarde
25 de Maio	39°,8	40°,5	40°,9
26 " "	39°,8	39°,7	39°,7
27 " "	39°,7	39°,7	40°
30 " "	39°,6	39°	39°,8
31 " "	38°,7	39°	40°
1.º de Julho	39°	39°,6	40°
2 " "	39°	39°,8	40°,3
3 " "	39°,5	39°,4	39°,6
4 " "	39°,4	39°,8	40°
5 " "	40°	39°,5	39°,5
6 " "	39°,	38°,7	38°,3

	Manhã	Meiodia	Tarde
7 de Julho	39°,5	39°,5	39°,5
8 » »	39°	38°,6	38°,8
9 » »	38°,7	38°,4	39°,4
10 » »	37°,5	38°,7	39°,2
11 » »	39°,5	39°,8	39°,3

A's 4 horas da manhã o doente morreu. Pela autopsia apenas verificou-se pequena tumefacção das placas de Peyer, baço *diffuente*, fígado *exsangne* e *gorduroso*, apresentando, como todas as molestias de temperaturas excessivas, nodulos grisalhos de *steatose*, rins extremamente congestos e os demais órgãos nada apresentando de anormal.

Obs. III.—Mignon..., do segundo regimento de zuavos, entrado para o hospital de Hanouï em 13 de Agosto de 1885 com o diagnostico de febre palustre. Está ha tres mezes em Tonkin, doente dous dias antes de entrar para o hospital, accusando atordoamento, cephalalgia, vertigens, febre subcontinua com remissão relativa para o meio da noite, diarrhéa, e na tarde anterior transpiração abundante e erupção miliar confluenta. O fígado e o baço volumosos, lingua tremula, difficuldade nas percepções, delirio á noite e mais nada de anormal para o coração e os pulmões. Temperatura:

	Manhã	Meio dia	Tarde
13 de Agosto	39°,2	39°,6	39°,8
14 » »	38°,8	39°,2	39°
15 » »	38°,8	38°,8	39°
16 » »	37°,7	37°,7	38°,8
17 » »	36°,6	36°,6	37°,3
18 » »	36°,8	36°,8	37°,2
19 » »	36°,8	36°,8	37°

Melhora sensivel desde o dia 15, desapparecendo n'esta data os phenomenos typhicos; diarrhéa persistente e baço ainda enormemente congestionado e crescido. Nos dias 17 e 18 febrícula caracterisada pela elevação relativa da temperatura ao

meio dia, ás 4 horas da tarde começando a transpiração profusa que durou até o dia seguinte pela manhã. Nos dias 22 e 23, depois do meio dia, cephalalgia e mal estar indefinido. A temperatura, que só poudé ser tomada do dia 24 em diante, é a seguinte:

	Manhã	Meio dia	Tarde
24. de Agosto	37°,7	38°,8	39°,2
25 " "	38°,9	39°,6	39°
26 " "	37°,9	39°,3	38°,8
27 " "	38°,8	37°,5	37°
28 " "	37°,3	37°	35°,4

A partir d'esta data apyrexia definitiva.

A administração da quinina não tendo sido continuada em dóse sufficiente, sobreveio no doente uma recahida, no decimo terceiro dia após a data da invasão primitiva (recidiva de tipo biseptano).

Levando em consideração estes factos (e eu poderia a proposito citar outros exemplos) sob certos pontos de vista, um tal typo poderia denominar-se—typho recorrente, que é equivalente a—febre remittente de recidiva. N'esta segunda crise, com a ausencia de todo phenomeno typhico coincidio a suspensão da diarrhéa.

(*Continúa*).

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

A ANTIFEBRINA, NOVO MEDICAMENTO ANTITHERMICO.—Cahn e Hepp deram o nome de antifebrina ao acetanilide, que tem por formula $C_6 A_6 Az HC_2 H_3O$.

E' uma substancia crystallina, branca, sem cheiro, dando ao contacto da lingua uma ligeira sensação caustica, mais ou menos soluvel na agua a frio, mais ainda a quente, muito soluvel no alcool e no vinho. Funde na temperatura de 113°, ferve na de 293° e tem a reacção neutra.