

Trata-se de um menino de tres annos e meio accommettido de vomitos e gritos interrompidos por um estado semi-comatoso de vez em quando, temperatura rectal abaixo de 37° anuria completa e o ventre extremamente dolorido. A creança tinha tomado no dia anterior uma dose de santonina de 10 centigrammas. O leite, o chá e outros remedios foram empregados sem que de modo algum melhorasse o doentinho. Só do terceiro dia em diante é que as urinas voltaram e os outros symptomas se modificaram, ficando elle restabelecido.

O emprego da santonina é tão commum, principalmente associada ao calomelanos, o que já tem occasionado envenenamentos, que é bom vulgarisar estes factos, chamando para elles a attenção dos medicos. Segundo Kilner a santonina branca é mais toxica do que a santonina amarella pela exposição á luz solar, o que aliás nada rouba de suas virtudes therapeuticas.

Sob o ponto de vista da dose o Dr. Laure pensa que não deve exceder de cinco centigrammas em um menino de menos de dous annos.

Lewin e Caspari recommendam administrar a santonina em solução oleosa, porquanto sob esta forma o medicamento é absorvido pelos intestinos e lentamente, para permittir um contacto mais prolongado com os vermes intestinaes.

Nestes casos nunca podem ser observados phenomenos nervosos ou visuaes. Becker e Binz consideram o ether e o chloral principalmente, como os melhores antidotos da santonina.

FORMULAS DO IODOFORMIO PARA USO EXTERNO.—O iodoformio é empregado com bons resultados sob a forma de pomada, suppositorio, glyceroleo, soluções ethereas ou alcoolicas, pilulas e lapis, nos cancrios, herpes, ulceras e até para granulações conjunctivaeç blenorrhagicas, etc., etc.

Nos cancrios eis a formula :

Iodoformio	100 partes
Acido thymico	200 »
Assucar de leite	1 »

Misture e reduza a pó impalpavel, para uso topico, tres vezes por dia.

Para as differentes formas de herpes emprega-se a preparação seguinte :

Iodoformio	40 grammas
Essencia de eucalyptos.....	15 »

Para loções duas vezes ao dia.

Nas granulações das palpebras emprega-se o pó seguinte com pincel :

Iodoformio	1 parte
Assucar de leite	5 »

Na blennorrhagia é usado em suppositorio na seguinte proporção :

Iodoformio pulverisado.....	2 grammas
Manteiga de cacáo	30 »

O cheiro nojento da substancia pode ser mascarado com o benjoim e o balsamo peruviano.

A formula da pomada é esta :

Iodoformio	4 grammas
Balsamo do Perú	8 »
Vaselina	40 »
Essencia de hortelã	8 gottas

Para ulcêras syphiliticas e venereas, psoriasis. eczema, orquite, etc. tres vezes ao dia.

No tratamento das queimaduras pode se usar da mistura seguinte, muito util :

Iodoformio	4 grammas
Extracto de cicuta	2 »
Acido phenico cryst.....	5 centigrammas
Unguento rosado	30 grammas

Pode-se preparar tambem um collodio de iodoformio do modo seguinte :

Iodoformio	}	aná 2 grammas
Balsamo do Perú		
Sabão branco		
Collodio		30 grammas

Applica-se com um pincel com bons resultados, como anestesico, na gotta e nas nevralgias, etc.

A solução alcoolica etherea é do seguinte modo :

Iodoformio	1 parte
Alcool	} aná 2 partes
Ether sulfurico	

Empregado na arthrite chronica, nos engorgitamentos dolorosos e nas ulcerações syphiliticas, etc., cobrindo-se a parte depois com um tafetá ou outra qualquer substancia pouco permeavel.

Em tintura a formula é :

Iodoformio	1 parte
Iodureto de potassio	} aná 70 partes
Glycerina	
Alcool a 36°	200 »

Feita s. a. conserva-se, muito tempo.

Para suppositorio emprega-se :

Manteiga de cacáo	4 grammas
Iodoformio	120 »

Funde-se a manteiga ao banho maria e ajunta-se o iodoformio

Empregado nas ulceras do anus e nas hemorrhoides.

Em lapis a forma é esta :

Iodoformio em pó	} aná partes eguaes
Gelatina	

ou est'outra :

Iodoformio	} aná partes eguaes
Manteiga de cacáo	

A formula pilular não tem regra, por isso dispensamos de exhibil-a. (*Journal de Médecine de Paris.*)

Apezar de alguns pharmacologistas não reconhecerem o po-

der desinfectante do iodoformio, não ha duvida, como provam os factos e a observação clinica, que pelo menos elle promove a cicatrisação, impede as fermentações e neutralisa a acção de-leteria dos acidos nas decomposições das substancias organicas. (*Nota da redacção*).

METEOROLOGIA

RESUMO DAS OBSERVAÇÕES METEOROLOGICAS DO MEZ DE MARÇO DE 1887

Pelo Cons. Dr. ROSENDO A. P. GUIMARÃES

A temperatura média do mez foi 27°, 93; no mesmo mez do anno passado 27°, 62. A temperatura ao sol, na média, 40°, 02; no mez do anno passado 40°. A temperatura maxima 31°25; no mez do anno passado 30°50. A minima 25°50; no mez do anno passado 25°50. A média maxima dos dias 28°, 69; no mez do anno passado 28°, 40. A média minima das noites 26°, 79; no mez do anno passado 26°, 55.

A pressão barometrica média, observada no barometro 755^{mm}, 38, e calculada a zero 751^{mm}, 38; no mez do anno passado foi esta 751^{mm}, 80. (Pressão maxima 780^{mm}; minima 753^{mm}).

O pluviometro marcou 154 millimetros de agua de chuva, equivalentes a 6 litros, 160; no mez do anno passado marcou 172 millimetros, equivalentes a 6 litros, 880; differença para menos 18 millimetros, equivalentes 0 litro, 720.

Os ventos forão variados e irregulares desde o principio do mez até o fim, sendo notados es de N, ENE, NO, ESE, E e S; o mais constante e regular foi o de N.

Houve 9 dias de chuva, 9 de trovoadas, e muitas noites de relâmpagos; no mez do anno passado 13 dias de chuva e 5 de trovoadas.

O hygrometro oscillou entre 84° e 90°.

—Tendo completado, no dia 31 de março findo, o anno