

PATHOLOGIA INTERTROPICAL

CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DAS FEBRES INTERTROPICAES

Pelo Dr. GRALL

MEDICO DE 1.ª CLASSE DA MARINHA FRANCEZA

(Continuação da pag. 338)

Obs. IV. — Vasseur, soldado encarregado da equipagem, admittido ao hospital em 21 de Junho, após quatro mezes de estada em Tonquim. Na vespera foi acommettido de um forte accesso febril, continuo, com prostração, estado subtyphoide, respiração frequente e anciosa, baço e figado tumefeitos, albuminuria, etc. O doente não soffrera de molestias febris anteriormente e seu estado geral era magnifico. Considerando-se o caso como de uma febre climatica o primeiro tratamento consistio em purgativos, sendo administrada a quinina somente no quinto dia.

Durante os onze dias da molestia franca a temperatura fôra :

	Manhã	Meio dia	Tarde
21 de Junho	—	—	39°,4
22 » »	39°	39°,6	39°,4
23 » »	39°,5	39°	38°
24 » »	38°,2	38°,5	38°
25 » »	38°,9	39°,8	39°,5
26 » »	39°	40°	39°,8
27 » »	38°,7	38°,8	38°,5
28 » »	39°	38°,6	38°,5
29 » »	38°	38°,4	38°,2
30 » »	36°,7	37°,7	37°
1° de Julho	36°,5	37°,5	37°,5

No curso da convalescença houve accessos francamente intermitentes, e o doente teve de mudar de terra incompletamente restabelecido.

Obs. V. — Braing, soldado de fileira, entrado para o hospital

em 7 de Julho de 1885, depois de estar em Tonquim quatro mezes.

Durante dez ou doze dias os prodromos avisam ao individuo, que procura então o hospital. No dia da entrada febre intensa, aspecto de impaludismo chronico, delirio, insomnia, excitação enorme, lingua saburrosa e corada nos hordos, baço e figado muito crescidos, albuminuria, etc. Este estado se mantém apesar da energica intervenção e de alguma declinação da curva thermica, como se vê.

	Manhã	Meio dia	Tarde
7 de Julho	—	—	39°,8
8 » »	39°,4	38°,2	38°
9 » »	37°,5	38°,5	38°,2
10 » »	37°,8	38°,6	38°,4
11 » »	38°	38°,8	39°

O doente morre na manhã do dia 12 em estado comatoso.

Obs. VI. — Carou, soldado de fileira, entrado a 14 de Junho, vindo de Chu. Entra em estado de coma, com o baço enorme, bem como o figado, o que se agrava e o faz succumbir na manhã seguinte. A temperatura da vespera fôra: pela manhã de 41°,5, ao meio dia de 41°,8 e á tarde de 39°,9; e no dia da morte fôra de 41°,5.

Obs. VII. — Jehan, soldado da equipagem, entrado em 26 de Julho, tres mezes depois de demora em Tonquim. No começo diarrhéa biliosa, tres dias antes da entrada febre subcontinua com estado typhoide, albumina nas urinas, remissão incompleta pela manhã, figado enorme e o baço. No dia da entrada a temperatura fôra de 38°,8 á tarde; no dia 27 fôra de 38° pela manhã, de 39° ao meio dia e de 37°,8 á tarde; no dia 28 pela manhã a temperatura sóbe a 40°,7 e dá-se a morte do doente no meio de dyspnéa extrema e escarros sanguinolentos.

A autopsia deste doente deu a conhecer, além dos indícios do impaludismo, congestão generalizada de ambos os pulmões.

Obs. VIII. — Gervais, soldado de fileira, entrado a 7 de Julho para o hospital, cinco mezes depois de estar em Tonquim e seis

dias depois de ser acommettido da molestia. Apresenta baço muito volumoso, fígado doloroso á pressão, diarrhêa biliosa, febre subcontinua, adynamia extrema, etc. Depois de uma ligeira remissão recrudescem os phenomenos febris e o doente morre por hyperthermia, apresentando pouco antes albumina na urina.

Durante o pequeno curso da molestia eis a temperatura :

	Manhã	Meio dia	Tarde
8 de Julho	38°,4	39°,5	39°
9 » »	38°	37°,8	37°,5
10 » »	37°,5	39°,2	39°
11 » »	39°,2	39°,3	38°,2
12 » »	39°,2	39°,3	38°,2
13 » »	40°,5		

FÉBRES PALUSTRES CONTINUAS POUCO VULGARES

Obs. I. — Mah, soldado do segundo batalhão de caçadores a pé, entrado para o hospital em 25 de Junho de 1885, depois de estar um mez em Tonquim. Quando entrou havia já oito dias que fôra acommettido de um estado febril continuo, sem symptomas abdominaes. O diagnostico da entrada foi de febre climatica e o tratamento prescripto o de purgativos.

No dia 25 á tarde 39°,5 ; no dia 26 pela manhã 38°,5, á tarde 29°,5 ; no dia 27 pela manhã 38°,5, á tarde 37°,5.

Depois de meio dia de apyrexia a temperatura sóbe rapidamente e conserva-se em 39°,5 ; fôra disso nenhum symptoma outro.

No dia 29 pela manhã a temperatura era de 39°, á tarde de 39°,2 ; no dia 30 pela manhã 40°,4, á tarde 39°,7 ; em 1° de Julho manhã 40°,1, tarde 40° ; no dia 2, manhã 40°,8, tarde 40° ; no dia 3, manhã 38°,8, á tarde 40°,2. N'esta data a intelligencia conserva-se intacta, pouca fraqueza e nenhum symptoma abdominal, apenas nota-se para o lado dos pulmões indicios de asthenia cardio-vascular.

No dia 4 pela manhã a temperatura era de 39°, á tarde de

38°,2; no dia 5 a temperatura é tomada também ao meio dia, sendo pela manhã de 38°,5, ao meio dia 38°,8 e á tarde de 38°,5; no dia 6 pela manhã 38°,4, á tarde 38°,7; no dia 7, manhã 40°,8, á tarde o doente morre.

A autopsia só demonstrou o baço muito volumoso e nenhuma outra lesão.

Obs. II. — Le Thie, soldado de zuavos, entrado para o hospital em 12 de Maio por anemia palustre, após quatro mezes de demora em Tonquim. Vinte dias depois de entrar no hospital o doente é acommettido de dysenteria, o que o reteve de cama alguns dias. Por ultimo apresenta-se a febre com as temperaturas seguintes:

	Manhã	Tarde
23 de Junho	40°	40°,2
24 » »	40°,5	40°,3
25 » »	39°,4	38°,2
26 » »	39°	38°,8
27 » »	27°,8	38°,6
28 » »	38°,4	39°,5
29 » »	37°,5	38°
30 » »	apyrexia.	

No dia 2 de Julho reaparece a febre, oscillando entre 38°, 39° e 40°,4. A' noite d'este dia o doente morre. A autopsia só patenteou baço crescidissimo.

Prognostico. — Como se vê a característica das fórmulas graves do impaludismo no periodo inicial é menos a clareza dos symptomas do que a marcha hesitante e de algum modo prolongada de cada estadio. O accesso começa de 2 para as 3 horas da manhã; entretanto o maximo de temperatura sobrevém só dez a doze horas mais tarde. A defervescencia igualmente não se accentúa, nem os suores apparecem senão no começo da noite, ás vezes mais tarde.

A gravidade dos casos não está em relação com a intensidade dos accessos, mas sim com a duração de seu periodo de estado,

o algarismo da remissão menos importante que sua precocidade. O caso só pode ser considerado de media gravidade quando a remissão se manifesta já ás 4 horas da tarde, qualquer que tenha sido o grão de calor pela manhã e ao meio dia.

O doente é seriamente atacado quando o abaixamento da temperatura começa de 4 horas da tarde em diante. O caso é muito grave se a remissão, seja qual fôr o seu grau, apenas no começo da noite vai se manifestando: é quasi sempre mortal se nesta hora, no terceiro ou quarto dia de tratamento, o abaixamento da temperatura não é notavel, mesmo que a do dia seguinte pela manhã não diminua.

Diagnostico differencial. — A este respeito não poderei dizer mais do que já o fiz em um trabalho anterior, para o qual envio o leitor, só accrescentando a nota seguinte:

A não ser no impaludismo e especialmente na febre remitente inicial, em nenhum caso se encontra esta curva especial, sobre que tanto insiste, com este duplo character: a maxima observada ao meio dia e a minima á noite.

Therapeutica. — A' medida que citei os casos morbidos indiquei logo os agentes therapeuticos do tratamento. Dous medicamentos constituem a sua base, a ipecacuanha e a quinina. Nos primeiros dias convém associar-os; mas depois é bom dar cada um separadamente e em horas differentes. A ipecacuanha será tomada pela manhã ou durante a metade do dia; a quinina deve ser administrada á tardinha ou na primeira metade da noite.

Além do phenomeno do vomito, o estado nauseoso e a repercussão intestinal que a ipecacuanha occasiona em dóse moderada, o descongestionamento do figado e do baço se dá quasi sempre com muita efficacia e promptidão.

(*Continúa.*)