

o segundo facto é o effeito produzido pela pilocarpina, isto é, os effeitos diuretico e purgativo, ao ultimo dos quaes devo o restabelecimento de minha doente.

REVISTA DA IMPRENSA MEDICA

TRATAMENTO DO DIABETES PELO ACIDO SALICYLICO. — Em suas ultimas pesquisas sobre o diabetes o professor Latham admitte duas especies:

1.º o diabetes originado de uma perturbação nervosa nas funcções do figado, tendo por effeito permittir a glycose passar no sangue sem experimentar alteração e depois apparecer na urina;

2.º o que provém de uma perturbação nervosa nas funcções musculares, permittindo á glycosia formar-se em excesso neste tecido, passar ao sangue e d'ahi á urina. Esta ultima especie é intimamente ligada ao rheumatismo, no sentido de que um grão de oxydação maior ou menor acarreta para o tecido muscular uma producção anormal lactica ou de glycose na economia. O mesmo autor demonstrou que pela administração do acido salicylico a formação do acido lactico e da glycosia diminue e pára.

Esta theoria de Latham se acha plenamente confirmada por seis observações que o Dr. Holden reata em seu trabalho. Este ultimo Dr. verificou que o effeito primitivo e mais notavel do tratamento de diabetes pelo acido salicylico nos diabeticos rheumaticos fôra a desaparição da polyuria, e ao mesmo tempo a diminuição do assucar na urina e da densidade desta. Em alguns casos rebeldes em que este tratamento não fez cessar completamente a presença do assucar na urina, diminuiu por tal modo que os doentes recobram sua compleição e robustez. O autor assevera que esta melhora permanece, como experimentou, durante algumas semanas sem o uso do medicamento.

A formula usada foi esta :

Acido salicylico	8 grammas
Bicarbonato de sodio	} aña 4 grs,
Carbonato de ammonia	
Agua	30 grammas

Quando a effervescencia cessar ajunte-se :

Agua	360 grammas
------------	-------------

Para tomar tres colheradas tres vezes por dia em vinho ou succo de laranja.

Sob o ponto de vista do tratamento é muito importante distinguir as duas especies de diabetes.

Em geral a presença ou ausencia de arthrite, de dóres, de caimbras rheumaticas é bastante para distinguir-se.

O Dr. Latham comprovou nos diabeticos rheumaticos, isto é, nos de origem muscular, que a urina continha uma substancia que dissolvia o oxydo de cobre, de modo que era preciso ajuntar maior porção do licor de Fehling para obter um precipitado como no caso do diabetes de origem hepatica. Esta especie não é tão rara como se pensa, e sempre é certa a sua cura instituindo-se o tratamento salicylado desde as primeiras manifestações symptomaticas. (*Journal de Médecine de Paris*, Janeiro de 1887, n. 5.)

OUTRO AGENTE EFFICAZ NO TRATAMENTO DO DIABETES DE ORIGEM ARTHRITICA. -- O Dr. Martineau apresentou á *Sociedade de Therapeutica*, em Paris, uma communicação sobre a cura do diabetes de origem arthritica por meio do *carbonato de lithina e do arseniato de sodio dissolvidos em agua gazosa*. Como a agua gazosa não pode ser considerada como agente de tratamento neste caso, pode-se mudar a forma medicamentosa, usando de pilulas do seguinte modo preparadas.

Carbonato de lithina	10 centigr.
Arseniato de sodio	3 milligr.
Extracto de genciana	5 centigr.

Para uma pilula, devendo-se usar duas por dia.