

Distancia do orificio anal, ao nivel da camada cuticular, ao extremo da cauda	0,1325
O anus sendo obliquo para diante ao nivel da camada muscular a terminação do recto está para diante do orificio cuticular	0,0159
Diametro do orificio anal	0,0053
Recto, obliquamente dirigido do anus para o lado da margem dorsal, mede	0,4505
Grossura do recto	0,0371
Grossura dos tubos ovaricos nas alças terminaes	0,0848
Largura dos tubos ovaricos, ao nivel do terço medio, herniados pelo ponto da fractura, vasios e achatados	0,3445
Largura do tubo intestinal ao mesmo nivel	0,0971
Largura dos campos lateraes ao mesmo nivel	0,1272
Largura de seu canal central	0,0053

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA PATHOLOGIA TROPICAL

Pelo Dr. PACHECO MENDES

Desde remota antiguidade se conhece a influencia que representam os parasitas na genese das molestias.

As observações modernas, secundadas pelos recursos de poderosos meios de investigação, aproveitando elementos que se offerecem ao medico no exercicio da clinica e que são tantas vezes desprezados, teem contribuido poderosamente para a elucidação de muitos problemas da pathologia tropical.

Está na consciencia de todos que não deve o clinico limitar sua acção em alliviar os soffrimentos do enfermo, mas amplial-a em prol da sciencia que professa, aproveitando todos os elementos que o acaso ou o espirito de curiosidade fizerem descobrir no sangue ou nos differentes liquidos de secreção do enfermo.

Não querendo, pois, incorrer em falta procedendo de modo contrario ás idéas expostas, offerecemos á apreciação dos collegas a estampa junta que representa o desenho de um parasita que encontramos na urina de um doente, victimado por hema-

turia tenaz e que resistio a todos os meios aconselhados em tal affecção.


De 2^m,626 de comprimento, o parasita mencionado é de cor branca acinzentada, tirando em alguns pontos para o encarnado. O corpo é roliço, attenuando-se para ambas as extremidades. A extremidade anterior é obliquamente truncada, e ahí se vê a bocca, de figura de acetabulo e rodeada de quatro dentes conicos, articulados, e com pontas convergentes umas para outras. A extremidade caudal vai gradualmente afilando-se e termina por dous appendices, que assemelhão-se a uma verdadeira bifurcação da extremidade posterior. Os appendices alludidos, que parecem constituir penis duplo, teem 0^m,500 de comprimento e 0^m,100 de largura.

Como se infere da propria estampa, o corpo do parasita em questão é formado por uma serie de segmentos, que diminuem para as extremidades, e apresentam-se mais ou menos cobertos de cilios vibrateis.

Apesar dos nossos esforços, não podemos descrever a anatomia e structura do parasita mencionado, mas, os caracteres que o distinguem levam-nos a collocar-o na classe das annellados, constituindo especie diversa das que são conhecidas nos tratados de entozoologia.

(1) Na impossibilidade de obter, pela razão exposta na nota infra, outros exemplares para um estudo completo do parasita encontrado na urina do nosso doente, enviamos o exemplar que possuímos a um notavel especialista, afim de ver se collocando-o em mãos mais habilitadas podemos melhor aproveitar o achado que a observação clinica nos porporcionou.

(1) Tendo-se aggravado o estado do nosso doente, aconselhamos-lhe, como recurso extremo, uma viagem á Europa, onde se acha já consideravelmente melhorado.



Augmentado

-61-